

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

(для выписывания в рецептах на итоговых занятиях и на экзамене)

для студентов лечебного и педиатрического факультетов

№ п/п	Название	Формы выпуска	Показание к применению (пример)	Способ применения (пример)	Высшие дозы для взрослых
1.	Прокаин (Procainum)	р-р 0,25%; 0,5% – 100; 200; 400 мл флакон; р-р 0,25%; 0,5% – 1; 2; 5; 10; 20 мл амп.	местная анестезия	инфильтрационная анестезия	ВРД-1,0 для 0,25% ВРД-0,75 для 0,5% ВРД-0,5 для 1-2%
		р-р 1%; 2% – 1; 2; 5; 10 мл амп.		проводниковая и перидуральная анестезия	
		свечи ректальные 0,1	геморрой	по 1 свече 1-2 раза в день в прямую кишку	
2.	Цинка сульфат (Zinci sulfas)	таб., покрытые оболочкой 0,124	дефицит цинка	по 1-2 таблетке в сутки внутрь за 1 час до еды или 2 часа после еды	ВРД внутрь-1,0
		р-р 0,25%-5; 10 мл флакон-капельница	конъюнктивит	по 1-2 капли в глаза 2-4 раза в день	
3.	Неостигмина метилсульфат (Neostigmini methylsulfas)	таб. 0,015	миастения	внутри за 30 минут до еды по 1 таблетке 1-2 раза в сутки	ВРД-0,015 ВСД-0,05
		р-р 0,05% – 1 мл амп.		в/в; в/м; п/к по 1-4 мл 1-2 раза в день; дети 0,1 мл на год жизни, но не более 0,75 мл	ВРД-0,002 ВСД-0,006
4.	Атропин (Atropinum)	р-р 1%- 5 мл флакон	иридоциклит	по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок до 3 раз в день с интервалом 5-6 ч.	
		р-р 0,05%; 0,1% – 1 мл амп.	премедикация наркоза	в/в; в/м; п/к по 0,25-1 мл; дети 0,01 мг/кг 1 раз в сутки	ВРД-0,001 ВСД-0,003
			отравление М,Н-холиномиметиками	в/в. Доза определяется тяжестью отравления. Допустимо значительное превышение высших доз	
5.	Платифиллин (Platyphyllinum)	р-р 0,2% – 1; 2 мл амп.	спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (колики)	п/к по 1-2 мл 3 раза в сутки; дети до 1 года по 0,035 мг/кг; с 1-5 лет по 0,03 мг/кг; с 6-10 лет по 0,025 мг/кг; с 11-14 лет по 0,02 мг/кг	ВРД-0,01 ВСД-0,03
		таб. 0,005		по 1 таблетке 2-3 раза в сутки; дети с 6-10 лет по 1/4 таблетке; старше 10 лет по 1/2 таблетке	
6.	Ипратропия бромид (Ipratropii bromidum)	аэрозоль дозированный (200 и 250 доз по 0,00002)	бронхиальная астма	для взрослых и детей старше 6 лет ингаляции по 2 вдоха 4 раза в день	ВСД 12 ингаляций
		р-р для ингаляций 0,025% -1; 2 мл амп.полиэтиленовые р-р для		взрослым и детям старше 12 лет ингаляции через небулайзер по 40 капель 3-4 раза в день с интервалом не менее 2 часов; дети с 6-12 лет по 20 капель 3-	

		ингаляций 0,025%- 20;25;30;50 мл флакон		4 раза в день; дети до 6 лет по 8-20 капель 3- 4 раза в день.	
7.	Азаметония бромид (Azamethonii bromidum)	р-р 5% – 1; 2 мл амп.	гиперто- нический криз	в/м, по 1-2 мл в/в медленно под контролем артериального давления до достижения целевого уровня по 0,2–0,5 мл 5% раствора, разведенных в 20 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы	ВРД-0,15 ВСД-0,45
8.	Эпинефрин (Epinephrinum)	р-р 0,1% – 1 мл амп.	анафилактиче- ский шок	п/к, в/м 0,3-0,5 мл или в/в 0,1- 0,25 мл в 10 мл 0,9% раствора хлорида натрия	ВРД – 0,001 ВСД – 0,005
			асистолия	внутрисердечно 0,5 мл в 10 мл 0,9% раствора хлорида натрия	
9.	Сальбутамол (Salbutamolum)	аэрозоль дозированный (90; 200;300 доз по 0,0001)	бронхиальная астма	взрослым и детям старше 2 лет ингаляционно по 1-2 дозе при приступе удушья, но не чаще 4-х раз в сутки	ВСД 12 ингаляций
		р-р 0,1% для ингаляций по 2,5;5;10 мл флакон и 0,1% и 0,2% р-р по 2,5 мл ампула		взрослым и детям старше 18 месяцев ингаляции через небулайзер ингаляционно по 2,5-5мг (2,5-5 мл 0,1% или 1,25-2,5 мл 0,2% р-ра) через небулайзер до 4 раз в день	
		порошок для ингаляций дозированный 100; 200 доз по 0,00025)		ингаляционно через портативный ингалятор Циклохалера взрослым по 1-2 дозы, детям по 1 дозе до 4-х раз в день	
10.	Фенилэфрин (Phenylephrinum) Мезатон (Mesaton)	р-р 0,125% по 5,10,15;30 мл флакон	острый ринит	детям от 2 мес до 1 года по 1 капле; с 1-2 лет 1-2 капли; с 2 лет и старше по 2-3 капли в каждый носовой ход, не более 4 раз в день	
		спрей 150 доз (10 мл и 220 доз (15 мл) по 0,000125/доза		детям с 4-6 лет по 1-2 дозы в каждый носовой ход; детям с 6 лет и старше по 2-3 дозы в каждый носовой ход, но не более 4 раз в сутки	
		р-р 2,5% по 5;10 мл флакон- капельница р-р 5%;10% по 10 мл флакон- капельница	иридоциклит	детям старше 6 лет (2,5%) по 1 капле в глаза 2-3 раза в день; детям с 12 лет (2,5%,5%,10%) и взрослым по 1 капле в глаза 2-3 раза в день.	
		р-р 1% – 1 мл амп.	острая гипотензия	п/к, в/м по 0,3-1 мл в/в по 0,1-0,5 мл, разведенных в 20 мл 0,9% раствора хлорида натрия или 5% раствора глюкозы	ВРД-0,005 в/в 0,01 в/м,п/к ВСД-0,025

		ректальные свечи по 0,005	геморрой	взрослым и детям старше 12 лет по 1 свече в прямую кишку до 4 раз в день	
11.	Пропранолол (Propranololum)	таб. 0,01;0,04	профилактика приступа стенокардии, артериальная гипертензия	внутри 2-3 раза в сутки по 0,04-0,08	ВСД – 0,32
12.	Теразозин (Terazosinum)	таб. 0,002;0,005	артериальная гипертензия, доброкачественная гиперплазия предстательной железы	внутри 1 раз в сутки по 0,001, через неделю дозу увеличивают до 0,002, потом через неделю до 0,005	ВСД-0,01
13.	Бисопролол (Bisoprololum)	таб., покрытые оболочкой 0,0025;0,005;0,01	артериальная гипертензия	внутри 1 раз в сутки утром по 0,00125-0,01	ВСД-0,02
14.	Этанол (Aethanolum)	р-р 40%	согревающий компресс	наружно и для приготовления лекарственных форм	
		р-р 70%	обработка рук хирурга		
		р-р 90%; 95% (чистое вещество, в рецепте термин «раствор» не пишется, но концентрация 95% указывается)	обработка мед. инструментов		
15.	Диазепам (Diazepamum)	таб. 0,005	невроз	внутри по 0,005-0,01 в сутки, в 2-4 приема	ВСД – 0,06
		таб., покрытые оболочкой 0,005			
		р-р 0,5% – 2 мл амп.	купирование судорог	в/в; в/м по 2-4 мл; дети до 5 лет до 0,005; после 5 лет до 0,01; взрослые до 0,02	
		микrokлизма 0,2% ректальный р-р -1,25 мл; 2,5мл; 0,4%-2,5мл и 5 мл	купирование судорог	по 1 микроклизме в прямую кишку с 6 месяцев и старше по 0,005-0,01	ВРД-0,01 ВСД-0,03
16.	Фенитоин (Phenytoinum)	таб. 0,1;0,117	профилактика эпилептического припадка	внутри по 1 таблетке 2-3 раза в сутки; дети до 5 лет ¼ таблетки 2 раза в сутки; 5-8 лет ¼ таблетки 3-4 раза в сутки; с 8 лет и старше ½-1 таблетке 2 раза в сутки	ВРД-0,3 ВСД- 0,8
17.	Фенобарбитал (Phenobarbitalum)	таб. 0,005 (для детей)	инсомния	внутри по 0,1-0,2 за 30-60 минут до сна	ВРД-0,2 ВСД -0,5

		0,05; 0,1	профилактика эпилептического припадка	внутри по 0,05-0,1 2 раза в сутки; дети 5-8 мг/кг в сутки	
18.	Доксиламин (Doxylaminum)	таб., покрытые оболочкой 0,015 флакон-капельница по 20 и 50 мл 2,5% р-ра	инсомния	внутри по 1 таблетке за 15-30 минут до сна ТД внутри 22 капли в 100 мл воды	ВРД – 0,03 ВРД 44 капли
19.	Леводопа и Карбидопа (Levodopum et Carbidopum)	таб. (содержат 0,25 леводопы и 0,025 карбидопы) № 50 и 100	болезнь паркинсона	внутри начальная доза по ½ таблетки 2 раза в день, поддерживающая терапия по 1 таблетке 3 раза в день	ВСД 8 таб.
20.	Кодеин + терпингидрат + натрия гидрокарбонат (Codeinum + Natrii hydrocarbonas + Therpinhydratum) Терпинкод	таб. (содержат 0,008 кодеина, 0,25 терпингидрата, 0,25 натрия гидрокарбоната) №10	приступы непродуктивного кашля	внутри взрослые и дети с 12 лет по 1 таблетке 2-3 раза в день	
21.	Морфин (Morphinum)	таб., покрытые оболочкой 0,005; 0,01 амп. по 5 мл 0,2%; 0,6%; 2% р-ра для приема внутри р-р 1% – 1 мл амп.	травматическая боль послеоперационная боль	ТД внутри по 0,005; 0,01 каждые 4 часа; дети с 3 до 7 лет 0,005 каждые 6 часов; с 7 до 17 лет (масса тела меньше 70 кг по 0,005 каждые 4 часа, больше 70 кг по 0,01 каждые 4 часа) п/к, в/м 0,01-0,03 в/в 0,001-0,003 каждые 10 мин. до анальгезии, предварительно развести в физ. р-ре; дети п/к, в/м 0,00005-0,0002 г/кг, ВСД 0,00015; в/в 0,00005-0,0001 г/кг каждые 10 мин. до анальгезии, предварительно развести в физ. р-ре	ВРД – 0,02 ВСД – 0,05
22.	Тримеперидин (Trimeperidinum)	таб. 0,025 р-р 1%; 2% – 1 мл амп.	боли, связанные с ожогом почечная колика	внутри 4-6 раз в сутки по 0,025-0,05 п/к, в/м, в/в с интервалом не менее 4 часов по 0,01-0,04; дети от 2-х лет 0,003-0,01	ВРД – 0,05 ВСД – 0,2 ВРД – 0,04 ВСД – 0,16
23.	Кислота ацетилсалициловая (Acidum acetylsalicylicum)	порошок по 0,5 в пакетиках (саше) таб. 0,1; 0,25; 0,325; 0,5 таб., покрытые оболочкой	боль, связанная с воспалительным процессом профилактика	внутри детям с 12 лет и взрослым по 0,25-0,5; с 6 лет по 0,25; с 3-х лет по 0,1 внутри за 30 минут до еды, запивая большим количеством	ВРД – 1,0 ВСД – 3,0

		0,05;0,075;0,1; 0,15;0,3 капсула 0,05;0,1	тромботическ их осложнений	жидкости по 0,05-0,3 1 раз в сутки		
24.	Парацетамол (Paracetamol)	таб., покрытые оболочкой 0,5; таб. 0,2;0,5	лихорадка при вирусном заболевании	внутри дети с 9 лет и взрослые по 0,5 через 6-8 часов; с 6 до 8 лет по 0,25; с 3 до 5 лет по 0,2	ВРД – 1,0 ВСД – 4,0	
		флаконы по 50 и 100 мл 1% р-р для инфузий				в/в рассчитывается на массу тела: до 10 кг по 0,75 мл/кг; с 10 до 50 кг по 1,5 мл/кг; с 50 кг по 100 мл 4 раза в день
		флакон по 100;200;300 мл 2,4% суспензии флакон по 50 и 100 мл 2,5% р-ра для приема внутри				внутри – детям от 3-6 мес. по 4 мл; от 6-12 мес. по 5 мл; с 1-2 лет по 7 мл; с 2-3 лет по 9 мл; с 3-6 лет по 10 мл; с 6-9 лет по 14 мл; с 9-12 лет по 20 мл; ТД 10-15 мг/кг
		свечи ректальные 0,05;0,1;0,25;0,5				ректально по 1 свече детям 10 лет и старше по 0,5; с 5-9 лет по 0,25; с 7 мес.-4 лет по 0,1; с 1-6 мес. по 0,05
25.	Ибупрофен (Ibuprofenum)	таб., покрытые оболочкой 0,2;0,4; капсула 0,2;0,4; гранулы для приготовления раствора для приема внутри в пакетиках по 0,2;0,4;0,6	лихорадка при вирусном заболевании	взрослым и детям старше 12 лет внутри 3-4 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов по 0,2-0,4	ВСД – 1,2	
		флакон по 90; 100; 150; 200 мл 2% суспензии				внутри после встряхивания флакона по 5-10 мг/кг дети с 3 мес. до 1 года по 2,5 мл; с 1-3 лет по 5 мл; с 4-6 лет по 7,5 мл; с 7 до 9 лет по 10 мл; с 10-12 лет по 15 мл не чаще 3-х раз в сутки.
		свечи ректальные 0,125;0,06				ректально от 3 мес до 2 лет по 0,06; с 2 до 6 лет по 0,125 не чаще 3-4 раз в сутки
		флакон по 4 и 8 мл 10% концентрата для приготовления раствора				в/в 0,1-0,4 (перед применением растворяют 4 мл в 100 мл и 8 мл в 200 мл 0,9% натрия хлорида или 5% глюкозы) 4 раза в сутки
		крем 5%-20,0; 50,0;100,0;150,0 гель 5%-20,0; 30,0;50,0;100,0;1 50,0 мазь 5% -25,0	боли в мышцах	наружно 3-4 раза в день над очагом поражения		
26.	Мелоксикам (Meloxicamum)	таб. 0,0075; 0,015;	артрит	внутри 1 раз в сутки по 0,0075- 0,015;	ВРД – 0,0075	

		<p>флакон по 100 мл 0,15% суспензии</p> <p>свечи ректальные 0,0075;0,015</p> <p>р-р 1% – 1,5 мл амп.</p> <p>гель - 1% -30,0; 50,0;100,0</p>		<p>дети от 12 лет и старше 0,00025/кг, но не более 0,015; с 2 до 12 лет 0,000125/кг</p> <p>по 0,0075-0,015 в прямую кишку 1 раз в сутки</p> <p>в/м по 0,5-1мл 1 раз в сутки не более 3-х дней</p> <p>наружно 2 раза в день над очагом поражения втирать 2-3 мин</p>	<p>ВСД – 0,015</p>
27.	Хлорпромазин (Chlorpromazinum)	<p>таб., покрытые оболочкой 0,025; 0,05 и 0,1</p> <p>драже 0,025; 0,05 и 0,1</p> <p>р-р 2,5% – 1; 2; 5; 10 мл амп.</p>	психоз	<p>внутри начальная доза 0,025-0,1 в сутки, разделенная на 1-4 приема, потом увеличение дозы до терапевтического эффекта;</p> <p>детям от 12 лет (масса больше 46 кг) 0,00055/кг</p> <p>взрослым и детям старше 12 лет в/м 0,1-0,15, в/в 0,05-0,075; дети с 1 до 5 лет по 0,04 в сутки; с 5 до 12 лет по 0,075 в сутки</p>	<p>ВРД –0,3</p> <p>ВСД – 1,5</p> <p>ВРД –в/в 0,1, в/м 0,15</p> <p>ВСД - в/в 0,25, в/м 1,0</p>
28.	Пустырника трава (Herba Leonuri)	<p>флакон по 10;15; 20; 25; 40; 50 мл настойки</p> <p>экстракт сухой таб. 0,014;0,028</p> <p>настой (3,0 на 100 мл воды) трава порошок в фильтр-пакетиках по 1,5</p>	повышенная нервная возбудимость	<p>внутри взрослые и дети старше 12 лет по 30-50 капель 3-4 раза в день</p> <p>внутри взрослые и дети старше 12 лет 1-2 раза в день по 0,014-0,028</p> <p>внутри полстакана 3 раза в день</p>	
29.	Корневища с корнями валерианы (Rhizomata cum radibus Valerianae)	<p>экстракт густой таб., покрытые оболочкой 0,02; 0,04</p> <p>экстракт сухой таб., покрытые оболочкой 0,125 драже 0,14</p> <p>флакон по 10;15; 20; 25; 30; 50 мл настойки</p> <p>настой (4,5 на 100 мл воды) корневища и корни порошок в фильтр-пакетиках по 1,5</p>	расстройство сна, связанное с перевозбуждением	<p>внутри взрослые и дети старше 12 лет по 0,02-0,04 за 30-60 минут до сна</p> <p>внутри взрослые и дети старше 12 лет по 1-3 таблетки 1-3 раза в день;</p> <p>взрослым по 1 драже 1 -2 раза в день; детям старше 6 лет по 1 драже 1 раз в день</p> <p>внутри 20-30 капель 3-4 раза в день;</p> <p>детям 1 капля на год жизни 1-3 раза в день</p> <p>внутри по 1 столовой ложке 3-4 раза в день;</p> <p>дети с 1 до 3 лет по ½ чайной ложке; с 3 до 6 лет по 1 чайной ложке; с 6-12 лет по 1 десертной ложке; с 12 лет и</p>	

				старше по 1 столовой ложке 2-3 раза в день	
30.	Амитриптилин (Amitriptylinum)	таб. 0,01;0,025 таб., покрытые оболочкой 0,01; 0,025	депрессия	внутри начальная суточная доза 0,025-0,05, разделенная на 2 приема; пожилые люди по 0,01	ВСД – 0,15
		р-р 1% – 2 мл амп.		в/м, в/в по 1-3 мл до 4-х раз в сутки	
31.	Пирацетам (Piracetamum)	капсула 0,2;0,4 таб., покрытые оболочкой 0,2; 0,4;0,8;1,2 флакон 125 мл 20% р-ра для приема внутрь	интеллектуально-мнестические нарушения	внутри 2,4-4,8 в сутки в 2-3 приема; дети с 3 лет 3 раза в сутки по 0,2; с 5 лет 2 раза в сутки по 0,4; с 8 лет 2 раза в сутки по 1,6	ВСД – 4,8
		р-р 20% – 5;10;15 мл амп. флакон по 50 и 100 мл 20% р-ра		в/м, в/в 12-24 мл в сутки в 2-4 приема дети с 8 лет по 8 мл 2 раза в сутки	
32.	Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный (Insulinum solubile humanum biosyntheticum)	флакон по 3; 5 и 10 мл (в 1 мл – 100 МЕ)	сахарный диабет	п/к, в/м по 0,3 – 1 МЕ/кг/сутки за 30 минут до еды в 3-6 приемов за сутки	
			диабетическая кома	в/в 0,1 МЕ/кг массы тела каждый час в 0,9% растворе натрия хлорида из расчета на 10 МЕ 100 мл	
33.	Глибенкламид (Glibenclamidum)	таб.0,00175; 0,0035; 0,005	сахарный диабет II типа	внутри за 20-30 минут до еды начальная доза по 0,00175-0,0035 в сутки, поддерживающая доза по 0,005-0,01 в сутки	ВСД – 0,015
34.	Тиамазол (Thiamazolium)	таб. 0,005 таб., покрытые оболочкой 0,01; 0,005	тиреотоксикоз	внутри после еды по 0,02-0,04 в сутки (за 2-3 приёма) до нормализации уровня гормонов с последующим уменьшением по 0,005-0,02 в сутки; детям с 3 до 17 лет 0,0003-0,0005 г/кг в сутки (за 2-3 приёма) до нормализации уровня гормонов, поддерживающая доза 0,0002-0,0003 г/кг в сутки	
35.	Преднизолон (Prednisolonum)	таб. 0,001;0,005	ревматоидный артрит	взрослым внутри начальная доза 0,02-0,03 в сутки, поддерживающая 0,005-0,01 в сутки, максимальная доза – утром (в 2-4 приема); детям от 3 лет и старше начальная доза 1-2 мг/кг в сутки, поддерживающая доза 0,3-0,6 мг/кг в сутки (в 4-6	

		р-р 1,5% – 2 мл; 3% – 1 мл амп.		приемов) взрослым в/м по 0,075-0,125 в сутки	
			анафилакти- ческий шок	в/в по 0,1-0,2 в сутки; детям с 2-12 месяцев 2-3 мг/кг; с 1-14 лет 1-2 мг/кг в сутки	
		мазь 0,5% –5,0; 10,0; 15,0	псориаз	на пораженные участки кожи 1-3 раза в день	
36.	Беклометазон (Beclometasonum)	аэрозоль дозированный 200 доз (50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза)	бронхиальная астма	взрослые и дети старше 12 лет ингаляционно через рот по 200-600мкг/сутки (за 2 инга- ляции в сутки); дети от 4 до 12 лет по 100-200 мкг/сутки (за 2 ингаляции в сутки)	
		суспензия для ингаляций 400 мкг/мл в пла- стиковых амп. по 2 мл		ингаляции через небулайзер взрослые по 2 мл 1-2 раза в день; дети старше 6 лет 1 мл 1-2 раза в день	
		спрей назальный дозированный 200 доз (50 мкг/доза)	аллергически й ринит	взрослым и детям старше 6 лет по 2 дозы (100 мкг) в каждый носовой ход 2 раза в сутки	
37.	Кислота никотиновая (Acidum nicotinicum)	таб. 0,05;0,5	пеллагра	внутри 2-4 раза в сутки после еды по 0,1	ВРД – 0,1 ВСД – 0,5
			гиперхолесте- ринемия	внутри по 0,5-1,0 в сутки после еды	
		р-р 1% –1;2; 5;10 мл амп.	ишемический инсульт	п/к; в/м; в/в медленно по 1 мл 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,1 ВСД – 0,3
38.	Колекальциферол (Colecalciferolum)	таб. растворимые 500;1000;2000; 4000;10000 МЕ	лечение рахита, профилакти- ка дефицита витамина Д	внутри детям и взрослым по 500-1000 МЕ профилактические дозы, лечебные 1000-5000МЕ, предварительно таблетку растворить в 15 мл (1 столовая ложка) 1 раз в сутки	
		флакон- капельница по 10;15;20;25;30 мл содержит водный р-р 15000 МЕ/мл (1 капля –500 МЕ)		внутри детям и взрослым по 500-1000 МЕ профилактические дозы (1-2 капли), лечебные 1000-5000МЕ (2-10 капель) 1 раз в сутки	
39.	Аминофиллин (Aminophyllinum)	таб. 0,15	бронхиальная астма	внутри взрослым и детям старше 10 лет по 1 таблетке 3-4 раза в сутки после еды; детям с 3 до 10 лет по 1 таблетке 2 раза в день	ВРД – 0,5 ВСД – 1,5
		р-р 24%-1 мл амп.	бронхообст- руктивный синдром	в/м глубоко в верхний наружный квадрант ягодицы по 1 мл 1-3 раза в сутки; детям ВРД 7 мг/кг	

		р-р 2,4%-5; 10 мл амп.		в/в медленно по 5-10 мл в 10-20 мл 0,9% раствора натрия хлорида 1-3 раза в сутки; детям разовая доза 2-3 мг/кг	
40.	Хлоропирамин (Chloropyraminum)	таб. 0,025	крапивница	внутри взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке 3-4 раза в сутки; детям от 3 до 14 лет по 1/2 таблетке 2 раза в день	
		р-р 2% – 1 мл амп.	ангионевротический отек	в/м; в/в взрослым и детям старше 14 лет по 1-2 мл 1 раз в сутки; детям до 12 мес. по 0,25 мл; от 1 до 6 лет по 0,5 мл; от 6 до 14 лет по 0,5-1 мл	
41.	Лоратадин (Loratadinum)	таб. 0,01	поллиноз	внутри взрослым и детям старше 12 лет 1 таблетка 1 раз в сутки; детям от 2 до 12 лет 1/2 таблетки 1 раз в сутки	
		флакон по 60; 100; 120 мл 0,1% сиропа		внутри взрослым и детям старше 12 лет по 10 мл 1 раз в день; детям от 2 до 12 лет 5 мл 1 раз в день	
42.	Метоклопрамид (Metoclopramidum)	таб. 0,01	тошнота	внутри 0,01 за 30 минут до еды 2-3 раза в сутки	
		флакон по 30 и 100 мл 0,1% р-ра		внутри 3 раза в день по 0,01	
		р-р 0,5% – 2 мл амп.	рвота	в/м; в/в по 2 мл 2-3 раза в сутки; детям старше 6 лет по 1 мл 1-3 раза в сутки; детям до 6 лет 0,0005-0,001/кг 1-3 раза в сутки	
43.	Омепразол (Omeprazolom)	капсула 0,01; 0,02; 0,04 таб., покрытые оболочкой 0,02;	язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки	взрослым и детям старше 2 лет внутри 1 раз в сутки по 0,01-0,04	
		флакон 0,04		в/в 1 раз в сутки 0,04, предварительно развести в 10 мл 0,9% натрия хлорида или 5% р-ре декстрозы	
44.	Фамотидин (Famotidinum)	таб., покрытые оболочкой 0,02; 0,04	язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки	внутри 0,02-0,04 в день	
		флакон 0,02		в/в 2 раза в сутки по 0,02, предварительно развести в 5-10 мл 0,9% натрия хлорида	
45.	Листья Сенны (Foliorum Sennae)	настой 1:20	запор	внутри по 1/2 стакана вечером после еды, перед употреблением взболтать	
		экстракт сухой в таб. 0,3		по 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой или по 1-2 таблетки на ночь и утром натощак	
46.	Магния сульфат (Magnesii sulfas)	порошок в пакетах по 10,0; 20,0; 25,0; 50,0	очищение кишечника перед	внутри 1 раз 20,0-25,0 натощак, предварительно развести в 200 мл воды	

			диагностическими процедурами		
		р-р 20%; 25% – 5; 10 мл амп.	гипертонический криз	в/в медленно 5-20 мл 25% р-ра	
47.	Бромгексин (Bromhexinum)	таб. 0,004;0,008	острый бронхит	внутри 3-4 раза в сутки детям от 3 до 6 лет 0,006-0,012 в сутки; детям от 6 до 10 лет 0,012-0,024 в сутки; детям старше 10 лет 0,024-0,048	
		флакон по 10;20; 30;40;50;60; 70;80;90;100 мл 0,08% р-ра		внутри взрослым и детям старше 14 лет по 10-20 мл 3 раза в день; детям от 6 до 14 лет по 10 мл 3 раза в сутки; детям от 3 до 6 лет по 5 мл 3 раза в сутки	
		флакон по 50;100 мл 0,16%;0,08% сиропа		внутри с помощью мерной ложки 3 раза в день сироп 0,16% взрослым и детям старше 14 лет по 5-10 мл; детям от 6 до 14 лет по 5 мл; сироп 0,08% детям до 2 лет 2,5 мл; детям от 2 до 6 лет по 5 мл	
48.	Дигоксин (Digoxinum)	таб. 0,00025; 0,0001(для детей)	хроническая сердечная недостаточность	внутри взрослые и дети старше 10 лет насыщающая доза 0,125 – 0,5 мг 1 раз в сутки, поддерживающая доза 0,125 – 0,75 мг в сутки; дети от 3 до 10 лет насыщающая доза 0,05 – 0,08 мг/кг/сут; поддерживающая доза 0,01 – 0,025 мг/кг/сут	ВСД – 0,0015
		р-р 0,025% – 1 мл амп.	наджелудочковая аритмия	в/в струйно 1-4 мл в 10-20 мл 20% р-ра глюкозы или капельно 1-4 мл р-ра в 100-200 мл 5% р-ра глюкозы или 0,9% р-ра натрия хлорида	
49.	Лидокаин (Lidocainum)	спрей дозированный 10% – 38 мл (340;650 доз по 0,0046 доза)	местная анестезия	на кожу и слизистые оболочки по 1-3 нажатия (терминальная анестезия)	ВРД-0,5 для 1-2% инфильтрационной ВРД-0,3 для 1-2% проводниковой
		гель 2%-10,0; 30,0;100,0 5%-15,0;25,0; 30,0;45,0;95,0		местно с помощью аппликатора на слизистую	
		пластырь 700 мг		1 пластырь в день на кожу в области боли на 12 часов, не более 3-х одновременно	
		р-р 1% – 2;3,5;10; 20 мл амп. р-р 2%-2;5;10 мл амп.		для всех видов местной анестезии	
		р-р 2% -1,5 мл тубик-		по 1-2 капли в глаза перед исследованием или операцией	

		капельница 5; 10 мл флакон- капельница			
		р-р 10% – 2 мл амп.	желудоч- ковая аритмия	в/в предварительно разводят 25 мл лидокаина в 100 мл 0,9% р- ра хлорида натрия взрослые и дети с 1 месяца ВРД 0,3 в час, ВСД 2,0	ВРД – 0,3 ВСД – 2,0
50.	Верапамил (Verapamilum)	таб., покрытые оболочкой 0,04; 0,08; р-р 0,25% – 2 мл амп.	предсердная тахикардия	внутри 3-4 раза в сутки по 0,04-0,08 в/в медленно, предварительно разводят 2 мл р-ра в 100-150 мл 0,9% р-ра хлорида натрия ТД 0,005-0,01	ВРД – 0,16 ВСД – 0,48
51.	Амлодипин (Amlodipinum)	таб. 0,0025; 0,005;0,01	артериальная гипертензия	внутри 1 раз в сутки по 0,0025-0,01	
52.	Кофеин (Coffeinum)	таб. 0,1 р-р 10% и 20% – 1; 2 мл амп.	снижение работо- способности при утомле- нии восстановле- ние дыхания после наркоза	взрослым и детям старше 12 лет 2-3 раза в день по 0,05-0,1 п/к 0,1-0,2; детям 0,025-0,1	ВРД – 0,4 ВСД – 1,0
53.	Эналаприл (Enalaprilum)	таб. 0,0025;0,005; 0,01; 0,02	артериальная гипертензия	внутри 1 раз в сутки по 0,01-0,02	ВСД – 0,04
54.	Лозартан (Losartanum)	таб., покрытые оболочкой 0,0125;0,025; 0,05;0,1	артериальная гипертензия	внутри 1 раз в сутки по 0,05	
55.	Гидрохлоро- тиазид (Hydrochloro- thiazidum)	таб. 0,025;0,1	артериальная гипертензия	внутри по 0,025-0,05 в сутки	ВСД – 0,1
56.	Фуросемид (Furosemidum)	таб. 0,04 р-р 1% – 2 и 4 мл амп.	хроническая сердечная недоста- точность гиперто- нический криз	внутри 1 раз в сутки утром по 0,02-0,04; дети 0,002/кг в/м, в/в (не быстрее, чем 0,004 в минуту) по 0,02-0,04 1 раз в сутки; дети 0,001/кг, ВСД 0,02	ВСД – 1,5 Дети ВСД 0,04 ВСД – 1,5 Дети ВСД 0,02
57.	Спиронолактон (Spironolactonum)	таб. 0,025 капсула 0,025; 0,05; 0,1	артериальная гипертензия	внутри 1 раз в сутки по 0,025-0,1	ВСД – 0,1
58.	Нитроглицерин (Nitroglycerinum)	таб. 0,0005 капсула 0,05 мл 1% масляного р-ра	купирование приступа стенокардии	под язык по 0,0005 при боли в сердце	ВСД – 0,001

		спрей дозированный подъязычный 1% – 10 мл (180; 200; 300 доз по 0,0004)		под язык по 1-2 дозы при боли в сердце	
		р-р 0,1% – 2; 5; 10 мл амп. и флакон по 50; 100; 500 мл	кардиогенный отёк лёгких	в/в, предварительно развести в 0,9% р-ре хлорида натрия в разведении 1/10; 1/20; 1/40 через автоматический дозатор 1-8 мг сутки	
59.	Изосорбида динитрат (Isosorbidi dinitras)	таб. 0,01; таб. пролонгированного действия 0,02; 0,04; 0,06	профилактика приступа стенокардии	внутри 4-5 раз в сутки по 0,01; таблетки пролонгированного действия по 1 таблетке 1-2 раза в сутки	ВСД – 0,12
		спрей подъязычный дозированный 2,5% – 15 мл (300 доз по 0,00125)	купирование приступа стенокардии	по 1 дозе в рот при боли в сердце	
		р-р 0,1% – 10 мл амп.	острый инфаркт миокарда	в/в, предварительно развести 1 ампулу в 100 мл 0,9% р-ра хлорида натрия через автоматический дозатор 1-8 мг сутки	
60.	Клопидогрел (Clopidogrelum)	таб. покрытые оболочкой 0,075; 0,15; 0,3 капсула 0,075	профилактика атеротромботических осложнений	внутри 1 раз в сутки по 0,075	
				при генетически низкой активности изофермента CYP2C19 доза увеличивается 1 раз в сутки до 0,15-0,6	
61.	Гепарин натрия (Heparinum natrium)	р-р 5000 МЕ/мл – 1; 2; 5 мл амп. флакон 1; 2; 5; 10 мл	профилактика тромбобразования при остром инфаркте миокарда	в/в по 5000-10000 МЕ (100-150 МЕ/кг) каждые 4-6 часов; п/к в белую линию живота по 8000-10000 МЕ каждые 8 часов	
		гель 1000 МЕ/г – 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 50,0; 60,0; 70,0; 80,0; 90,0; 100,0	поверхностный тромбоз флебит	на кожу над пораженной областью 1-3 раза в сутки	
62.	Ривароксабан (Rivaroxabanum)	таб., покрытые оболочкой 0,0025; 0,01; 0,015; 0,02	предоперационная профилактика тромбоемболии	внутри 1 раз в сутки по 0,0025-0,02	ВСД – 0,02
63.	Варфарин (Warfarinum)	таб. 0,0025; 0,003; 0,005	вторичная профилактика инфаркта миокарда	внутри 1 раз в сутки первые два дня по 0,0025-0,005, затем индивидуально под контролем протромбинового индекса	
64.	Менадион натрия бисульфит	таб. 0,015	гипопротромбин-	внутри 1-2 раза в сутки по 0,015	ВРД – 0,015 ВСД – 0,03.

	(Menadioni natrii bisulfis)	р-р 1% – 1; 2 мл амп.	емия, обусловленная дефицитом витамина К	в/м по 1-1,5 мл 1-2 раза в сутки	
65.	Кислота фолиевая (Acidum folicum)	таб., покрытые оболочкой 0,0004; 0,001 таб.0,001;0,005	макроцитарная гиперхромная анемия	внутри 1 раз в сутки по 0,001-0,005	ВСД – 0,005
66.	Железа сульфат и кислота аскорбиновая (Ferri sulfas et Acidum ascorbinicum)	таб., покрытые оболочкой (содержат железа 0,1 и аскорбиновую кислоту 0,06)	железодефицитная анемия	внутри взрослым и детям старше 12 лет по 2 таблетки в сутки	ВСД – 0,4
67.	Хлоргексидин (Chlorhexidinum)	флакон по 25;50; 70;100;200 мл 0,02%;0,05% р-ра	антибактериальная обработка слизистых оболочек ротовой полости	полоскать рот 2-3 раза в сутки	
		флакон по 100; 200 мл 0,2%;0,5% р-ра спрей 0,05%-50;100;150 мл	обработка раневой поверхности	обработка ран и санация половых путей	
		флакон по 100; 200 мл 1% р-ра	дезинфекция оборудования	дезинфекция оборудования	
		флакон по 50; 100 мл 0,5% спиртового р-ра; спрей спиртовой 0,5% – 50; 70; 100 мл	обработка операционного поля	протирать кожу стерильным тампоном, смоченным раствором	
		р-р 5%	приготовление растворов	в составе магистральных прописей	
		свечи вагинальные по 0,008; 0,016 таблетки вагинальные 0,016	профилактика заболеваний, передающихся половым путем	по 1 свече, 1 таблетке во влагалище не позднее 2ч после полового акта	
68.	Сульфациетамид (Sulfacetamidum)	флакон-капельница по 5 и 10 мл 10 % и 20 % р-ра тубик-капельница по 0,5;1;1,5;2 мл 10% и 20% р-ра	бактериальный конъюнктивит	в пораженный глаз по 1-2 капли 5-6 раз в сутки	

69.	Метронидазол (Metronidazolium)	таб. 0,25;0,5 таб., покрытые оболочкой 0,2; 0,4	эрадикация <i>Helicobacter pylori</i>	внутри взрослым и детям старше 15 лет 3 раза в сутки по 0,5; детям с 6 до 15 лет 2 раза в день по 0,25	ВСД – 4,0
			лямблиоз	внутри по 0,2 до 4 раз в сутки	
		свечи вагинальные 0,5 таблетки вагинальные 0,5	трихомо- надный вагинит	во влагалище по 1 свече 2 раза в сутки во влагалище по 1 таблетке в сутки	
		флакон по 100 мл 0,5% р-ра	внекишечный амебиаз	взрослым и детям старше 12 лет внутривенно капельно со скоростью не более 5 мл/мин по 100 мл через каждые 8 часов; детям до 12 лет 7,5 мг/кг каждые 8 часов	
		крем 1%-25,0	розацея	наносить на пораженные участки 2 раза в день	
		гель 1%-30,0	урогенитальн ый трихомониаз	1 аппликатор (5 г геля) во влагалище 2 раза в день	
70.	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacinum)	флакон- капельница по 5; 10 мл 0,3% р-ра	конъюнкти- вит, отит	по 1-2 капли в пораженный глаз каждые 4 часа по 5 капель в ухо 3 раза в день	Относи- тельно противопо- казан до 18 лет ВСД – 1,5
		мазь 0,3%- 3;5;10,0		полоску мази 1 см закладывать за нижнее веко 3 раза в день	
		таб., покрытые оболочкой, 0,25; 0,5;0,75;1,0	пиелонефрит	внутри 2 раза в сутки по 0,25-0,75	
		флакон по 100 мл 0,2% р-ра		в/в капельно по 100-200 мл 2 раза в сутки	
71.	Бензилпеницил- лин (Benzylpenicil- linum)	флакон 500000ЕД; 600000ЕД; 1000000 ЕД	инфекция нижних дыхательных путей	в/м; в/в по 4-6 млн ЕД за сутки, вводить каждые 4-6 часов, при тяжелой инфекции 10-20 млн ЕД в сутки; детям с 1 года 50000- 100000ЕД/кг в сутки в 4-6 приемов	
72.	Амоксициллин и клавулановая кислота (Amoxicillinum et Acidum clavulanicum)	таб. (содержат 0,25; 0,5 или 0,875 амоксициллина тригидрата и 0,125 калиевой соли клавулановой кислоты) N.10	острый тонзиллит	взрослые и дети от 12 лет и старше или с массой тела 40 кг и более не разжевывая внутри 3 раза в сутки по 0,25-0,75	
		таблетки диспергируемые 0,875/0,125; 0,5/0,125; 0,25/0,0625; 0,125/ 0,03125		взрослые и дети от 12 лет и старше или с массой тела 40 кг и более внутри 3 раза в день по 0,5/0,125, предварительно растворив таблетку в полстакане воды; дети от 2 до 12 лет внутри 3 раза в день по 0,125/ 0,03125	

			или 0,25/0,0625, из расчета 20-40 мг/кг в сутки (дозу разделить на 3 приема)	
		пакетик (саше) 1,8, содержащий гранулы для приготовления суспензии (содержит 0,875 амоксициллина и 0,125 клавулановой кислоты)		взрослые и дети от 12 лет и старше или с массой тела 40 кг и более по 1 пакетик внутрь 2 раза в день, предварительно развести в полстакане воды
		порошок для приготовления суспензии флакон 17,7;33,8 содержит 0,6 амоксициллина и 0,0429 клавулановой кислоты в 5 мл; флакон 8,75;12,5;17,5;35,0 по 0,4+0,057/5 мл; флакон 25,0 по 0,25+0,0625/5 мл; 0,125+0,03125/5 мл		встряхнуть флакон, добавить воды до 100 мл (до метки), встряхивая до полного растворения порошка; принимать внутрь после встряхивания с помощью мерной ложки через каждые 8 часов в суточной дозе 20-40 мг/кг амоксициллина
		порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций флакон (0,5 амоксициллина и 0,1 клавулановой кислоты); (1,0 амоксициллина и 0,2 клавулановой кислоты)		в/в взрослым и детям старше 12 лет каждые 8 часов предварительно развести содержимое флакона 0,5/0,1 в 10 мл воды для инъекций или 1,0/0,2 в 20 мл воды для инъекций; детям до 12 лет 30 мг/кг 3 раза в день
73.	Азитромицин (Azithromycinum)	таб., покрытые оболочкой 0,125; 0,25;0,5;1,0 капсула 0,25; 0,5	инфекция кожи и мягких тканей	внутри взрослые и дети старше 12 лет с массой тела выше 45 кг по 0,5- 1,0 раз в сутки за 1 час до или через 2 часа после еды; детям от 3 до 12 лет по 0,01/кг массы тела 1 раз в сутки за 1 час до или через 2 часа после еды
		таблетки диспергируемые 0,125;0,25;0,5;1,0		внутри взрослые и дети старше 12 лет с массой тела выше 45 кг по 0,5- 1,0 раз в сутки за 1 час до или через 2 часа после

				еды; детям от 3 до 12 лет по 0,01/кг массы тела 1 раз в сутки за 1 час до или через 2 часа после еды, предварительно растворив в полстакане воды	
		порошок для приготовления суспензии флакон 4,2 содержит 0,05/5 мл; 0,1/5 мл; 0,2/5 мл флакон 15,9 и 16,5 содержит 0,1/5 мл; 0,2/5 мл флакон 10,0;14,33;16,9;28,66;29,295; 35,573 содержит 0,2/5 мл	средний отит	энергично встряхнуть флакон, добавить воды до метки, принимать внутрь детям старше 6 месяцев по 0,01/кг массы тела 1 раз в сутки за 1 час до или через 2 часа после еды; с массой тела больше 45 кг 1 раз в сутки за 1 час до или через 2 часа после еды по 0,5	
		флакон 0,5 лиофилизата для приготовления раствора для инъекций			
74.	Гентамицин (Gentamicinum)	флакон-капельница по 5;10 мл и тубик-капельница по 1,5;2;5 мл 0,3% р-ра	конъюнктивит	по 1 капле каждые 4 часа в каждый глаз	ВСД – 0,005/кг массы тела
		р-р 4% – 1;2 мл амп.	острый пиелонефрит	в/м, в/в по 3мг/кг/сутки, кратность введения – 2-3 раза; детям от 1 месяца до 2 лет назначают 6 мг/кг/сут, кратность введения - 3 раза; детям старше 2 лет 3-5 мг/кг/сут, кратность введения – 3 раза	
		мазь 0,1%-10,0;15,0	инфекционный дерматит	на пораженные участки кожи 3-4 раза в сутки	
75.	Рифампицин (Rifampicinum)	капсула 0,15; 0,3;0,45;0,6	туберкулёз	внутри натошак за 30 минут до еды 0,45-0,6; детям старше 3 лет 10-20 мг/кг в сутки	ВСД взрослым – 0,9
		0,15 амп. флакон 0,15; 0,3; 0,45; 0,6		в/в капельно со скоростью 60-80 капель в минуту после полного растворения содержимого амп. или флакона 0,15 в 2,5 мл воды для инъекций (0,3 в 5 мл; 0,45 в 7,5 мл; 0,6 в 10 мл) и смешивают 0,15 с 125 мл 5% раствором глюкозы (0,3 в 250 мл; 0,45 в 375 мл; 0,6 в 500 мл) взрослым	

				и детям старше 12 лет по 0,01 г/кг массы тела (взрослым по 0,45-0,6); детям с 2 месяцев до 12 лет 0,015 г/кг 1 раз в сутки	
76.	Цефотаксим (Cefotaximum)	флакон 0,25;0,5; 1,0;2,0	перитонит	в/м, в/в по 1,0 после растворения в 4 мл воды для инъекций каждые 12 часов; детям весом до 50 кг доза 50-180 мг в сутки за 4-6 введений	ВСД-12,0
77.	Ацикловир (Acyclovirum)	таб. 0,2;0,4	герпетическая инфекция	внутри взрослым и детям старше 3 лет 5 раз в сутки по 0,2	
		мазь 5% – 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 30,0 крем 5%-5,0;10,0; 15,0		на пораженные участки кожи и слизистых оболочек 5 раз в сутки	
		мазь 3% – 3,0; 5,0		в нижний конъюнктивальный мешок по 1 см 5 раз в сутки	
		флакон 0,25; 0,5; 1,0		в/в капельно после растворения содержимого флакона в 10 мл стерильного 0,9% р-ра хлорида натрия или воды для инъекций через каждые 8 часов взрослым и детям старше 12 лет по 5 мг/кг; детям до 12 лет по 20 мг/кг	
78.	Хлорохин (Chloroquinum)	таб. 0,25	малярия	внутри 1 раз в сутки, в первый день по 1,0, через 6-8 часов по 0,5, во 2 и 3 дни по 0,75	ВРД – 0,5 ВСД – 1,5
79.	Мебендазол (Mebendazolium)	таб. 0,1	аскаридоз	внутри взрослым и детям старше 3 лет 1 таблетка утром и 1 таблетка вечером, курс 3 дня	
80.	Флуконазол (Fluconazolium)	капсула 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 таб., покрытые оболочкой 0,05; 0,1;0,15	кандидоз влагалища, баланит	внутри взрослым по 0,15 однократно; детям старше 3 лет 3-12 мг/кг 1 раз в день	
		гель 0,5%-15,0; 30,0	микоз стоп	на пораженный участок кожи 2 раза в сутки	
		флакон по 50; 100; 200 мл 0,2% р-ра	криптококковый менингит	в/в капельно взрослым 100-200 мл 1 раз в сутки; детям старше 1 месяца 3-12 мг/кг 1 раз в день	
		порошок для приготовления суспензии доза 10 мг/мл и 40 мг/мл, перед применением к содержимому флакона добавить 24 мл воды	профилактика кандидоза у больных со злокачественными опухолями	взрослым 200-400 мг 1 раз в сутки; детям старше 3 лет 3-12 мг/кг 1 раз в день	

Список сокращений: р-р - раствор; амп. – ампулы; таб. – таблетки; капс. – капсулы; в/м – внутримышечно; в/в – внутривенно; п/к – подкожно; /кг – на 1 кг массы тела.

ВРД – высшая разовая доза / максимальная рекомендуемая разовая доза; ВСД – высшая суточная доза / максимальная рекомендуемая суточная доза; ВКД – высшая курсовая доза / максимальная рекомендуемая курсовая доза.

* Кодеин обычно назначается в составе комбинированных препаратов «Терпинкод Н» («Terpinocodum N») – кодеин + терпингидрат, «Седал-М» («Sedal-M») – кодеин + кофеин + метамизол натрия + парацетамол + фенobarбитал и др.

Международное непатентованное название выделено **полужирным шрифтом**.