

ТЕСТЫ

По теме 1.8 «Бытовые травмы и поражения»

1. Перкутанный путь поступления яда в организм – поступление через
2. В общем количестве отравления бытовые составляют:
3. При отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем в качестве антидота используется:
4. Ранняя клиническая стадия отравления, когда токсический агент находится в организме в токсической дозе, называется:
5. Пути поступления, выведения и распространения яда, связанные с кровоснабжением органов и тканей называются:
6. Выраженная дезориентировка, хаотическое двигательное возбуждение, легкая отвлекаемость, эмоциональная лабильность, симптом ложного узнавания, фиксационная амнезия, понижением слуха и остроты зрения, дизартрия, атаксия, парестезии – симптомы, характерные для стадии:
7. Иммобилизация картонно – марлевым воротником Шанса осуществляется при:
8. При поражении соединениями тяжелых металлов и мышьяка в качестве антидота используется:
9. При падении людей на улице чаще всего случаются:
10. Отравления, которые имеют целью вызвать к себе сочувствие, продемонстрировать свое несогласие с чем-либо, протест называются:
11. Травмы, полученные пострадавшими вне производственной деятельности, на улицах, в открытых общественных местах, в поле, в лесу, независимо от вызвавших причин относятся к:
12. Преддошкольный детский травматизм – травматизм детей в возрасте:
13. К основным признакам повреждения бедра не относится:
14. При переломе бедра лучше всего использовать стандартную шину:
15. Иммобилизация при переломах плеча и повреждении смежных суставов осуществляется путем прибинтовывания конечности к туловищу повязкой:
16. Иммобилизация картонно – марлевым воротником при повреждениях шейного отдела позвоночника называется иммобилизацией по типу:
17. При окончательном переломе ребра используются для внешней фиксации используются пластины по методу:
18. Шкала комы Глазго состоит из трех групп тестов: речевой, двигательной и:
19. При интерпретации полученных результатов по шкале комы Глазго при количестве баллов от 9 до 10 отмечается:
20. Больных с легкой черепно-мозговой травмой следует госпитализировать для наблюдения на срок: