Вопросы тестов темы 1.6

№ 10601/5 Комплекс нарушений гомеостаза и функций основных систем жизнеобеспечения (кровообращения, дыхания), которые собственными силами организма, без медицинской помощи, не могут быть компенсированы и неизбежно приводят к смерти это...?

1) терминальное состояние

№ 10602/2 Что не является видом терминального состояния?

1) преагональное состояние

2) агональное состояние

3) постагональное состояние

4) параагональное состояние

5) периагональное состояние

6) клиническая смерть

7) биологическая смерть

8) морфологическая смерть

№ 10603/5 Терминальное состояние, при котором сознание чаще отсутствует; пульс нитевидный или исчезает совсем, артериальное давление не определяется, дыхание поверхностное, учащено, судорожное или значительно урежено это...?

№ 10604/5 Терминальное состояние, которое характеризуется прекращением функции ЦНС, сердечной деятельности и дыхания при условии сохранения обменных процессов в тканях и возможность восстановления жизнедеятельности организма это...?

№ 10605/2 Что из нижеперечисленного характерно для клинической смерти?

1) прекращение функции ЦНС

2) прекращение сердечной деятельности и дыхания

3) невозможность восстановления жизнедеятельности организма

4) отсутствие обменных процессов в тканях

5) в клетках головного мозга отсутствуют необратимые изменения

6) в клетках головного мозга присутствуют необратимые изменения

7) отсутствуют рефлексы

8) рефлексы значительно снижены, их полное отсутствие говорит о биологической смерти

№ 10606/1 Продолжительность клинической смерти в обычных условиях составляет...?

1) 7-8 мин

2) 1-2 мин

3) 8-12 мин

4) 5-6 мин

5) 3-5 мин

№ 10607/1 При острой остановке сердца нарушение дыхания наступает на...?

1) На 2-ой минуте

2) На 2-5 секунде

3) На 3-ей минуте

4) На 20-50 секунде

5) На 3-5 минуте

№ 10608/1 Какой признак не характерен в случае острой остановки сердца?

1) Отсутствие сознания

2) Расширение зрачков

3) Бледность, реже цианоз кожных покровов

4) Отсутствие пульса на периферических артериях

5) Остановка дыхания

6) Все признаки характерны для острой остановки сердца

№ 10609/2 Прекращение нагнетательной функции сердца возникает в результате...?

1) Асистолии

2) Фибрилляции желудочков

3) Фибрилляции предсердий

4) Гипосистолии

5) Изолинии

№ 10610/1 Маятникообразное перемещение крови из артерий в вены, потом из вен в артерии называется...?

- 1) Феномен Мешалкина
- 2) Феномен Сафара
- 3) Феномен Греймлиха
- 4) Феномен Амбу
- 5) Феномен Селлика

№ 10611/1 По Сафару при проведении реанимации выделяется...?

- 1) 3 стадии и 9 этапов
- 2) 3 стадии и 6 этапов
- 3) 2 стадии и 8 этапов
- 4) 2 стадии и 4 этапа
- 5) 2 стадии и 6 этапов

№ 10612/1 Первый этап первой стадии проведения реанимации по Сафару включает в себя...?

- 1) Экстренную искусственную вентиляцию легких
- 2) Восстановление проходимости верхних дыхательных путей
- 3) Поддержание кровообращения
- 4) Восстановление сознания
- 5) Коррекцию недостаточности функции органов

№ 10613/3 Укажите последовательность этапов первой стадии проведения реанимации по Сафару?

- 1) экстренная ИВЛ и оксигенация
- 2) поддержание кровообращения
- 3) восстановление проходимости дыхательных путей

№ 10614/1 Вторая стадия проведения реанимации по Сафару называется...?

- 1) Элементарное поддержание жизни
- 2) Постреанимационная интенсивная терапия
- 3) Дальнейшее поддержание жизни
- 4) Первичный реанимационный комплекс
- 5) Длительное поддержание жизни
- 6) Поддержание кровообращения

№ 10615/2 Реанимационные мероприятия не проводятся при...?

- 1) наличии признаков клинической смерти
- 2) наличии признаков агонии
- 3) наличии признаков предагонального состояния
- 4) наличии признаков биологической смерти
- 5) наличии признаков постагонального состояния
- 6) состоянии клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью

№ 10616/2 Реанимационные мероприятия прекращают при...?

- 1) констатации смерти человека на основании смерти головного мозга+
- 2) наличии признаков клинической смерти
- 3) неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций, в течение 20 минут
- 4) неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций, в течение 30 минут
- 5) неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций, в течение 60 минут
- 6) наличии тяжелых травм и заболеваний

№ 10617/1 Тройной прием Сафара предназначен для...?

- 1) Восстановления работы сердца
- 2) Возвращения сознания пострадавшему
- 3) Удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
- 4) Остановки наружного кровотечения
- 5) Восстановления проходимости верхних дыхательных путей и предотвращение западания языка

№ 10618/2 Тройной прием Сафара состоит из...?

- 1) запрокидывания головы
- 2) открывания рта
- 3) выдвигания нижней челюсти
- 4) проведения вдоха
- 5) массажных толчков
- 6) поворота головы

№ 10619/1 Тройной прием Сафара противопоказан...?

- 1) при переломе шейного отдела позвоночника
- 2) при беременности
- 3) при открытой черепно-мозговой травме
- 4) при острой дыхательной недостаточности
- 5) при пулевом ранении лобной области головы
- 6) при отравлении концентрированными кислотами и щелочами

№ 10620/1 Для ликвидации обструкции верхних дыхательных путей инородным телом используется...?

- 1) Прием Греймлиха
- 2) Прием Сафара
- 3) Прием Селлика
- 4) Прием Мешалкина
- 5) Прием Амбу

№ 10621/2 При проведении ИВЛ способ «рот в нос» применяется при...?

- 1) отравлении кислотами и щелочами
- 2) при травме рта
- 3) невозможности открыть рот
- 4) ранении шеи
- 5) инородном теле гортани

№ 10622/1 Эффективность искусственного дыхания проверяется...?

- 1) по наличию движений грудной клетки при вдохе и выдохе
- 2) по наличию реакции зрачков на свет при вдохе
- 3) по отклонению кусочка ваты, поднесенной к носовым ходам
- 4) по запотеванию зеркала, поднесенного к носовым ходам или рту
- 5) по наличию (появлению) самостоятельного дыхания
- 6) по наличию пульсации на сонных или бедренных артериях при вдохе

№ 10623/1 При сердечно-легочной реанимации необходимо чередовать...?

- 1) 8 нажатий и 2 вдоха
- 2) 20 нажатий и 3 вдоха
- 3) 30 нажатий и 2 вдоха
- 4) 6 нажатий и 2 вдоха
- 5) 12-15 нажатий и 3 вдоха

№ 10624/5 Резкий удар кулаком с высоты 20-30 см по груди на границе средней и нижней трети с немедленным последующим контролем пульса на сонной артерии это....?

№ 10625/1 При непрямом массаже сердца экскурсия грудной клетки у взрослых должна достигать...?

- 1) 7,5 см
- 2) 5 см
- 3) 2,5 см
- 4) 3 см
- 5) 8 см

№ 10626/1 Эффективность непрямого массажа сердца проверяется...?

- 1) по наличию движений грудной клетки при вдохе и выдохе
- 2) по наличию реакции зрачков на свет при вдохе
- 3) по порозовению кожных покровов при сжатии грудной клетки
- 4) по наличию движений грудной клетки при сжатии грудной клетки
- 5) по наличию (появлению) самостоятельного пульса
- 6) по наличию пульсации на сонных или бедренных артериях при сжатии грудной клетки

№ 10627/5 Повторно оценивать пульсацию на сонной артерии (в течение 3-5 с) необходимо после ... циклов искусственного дыхания и сжатия грудной клетки (укажите только цифру)?

№ 10628/5 При отсутствии самостоятельного дыхания проводить искусственное дыхание и определять наличие пульсации на сонной артерии после каждых ... вдуваний воздуха в легкие (укажите только цифру)?

№ 10629/2 Что не является осложнением реанимационных мероприятий?

- 1) Переломы рёбер и грудины
- 2) Повреждение внутренних органов – лёгких, печени, желудка
- 3) Попадание воздуха в желудок
- 4) Аспирация рвотных масс в дыхательные пути
- 5) Пневмония
- 6) Инородное тело верхних дыхательных путей

№ 10630/1 Сдавление пищевода между кольцом перстневидного хряща и шестым шейным позвонком для предупреждения пассивного вытекания желудочного содержимого это...?

1) Прием Сафара	2) Прием Греймлиха	3) Прием Робертсона
4) Прием Селлика	5) Прием Амбу	