

Контингент симптомы	Вид лечебных мероприятий	Догоспитальный	Госпитальный
Все лица, поступившие из очага	Промывание глаз, носа, рта 2% р-ром соды. Закапать оливковое или вазелиновое масло	Л, С, Т	-
	При болях в глазах – 2-3 капли р-ра дикаина 0.5%		
	Глазная мазь (0.5% синтоми-циновая или 10% сульфа-циловая)		
	Покой, согревание		
	Теплое молоко с содой		
	Свежий воздух		
	Вдыхание распыленного 1-2% р-ра тиосульфата натрия (антихлор) в течение 1-2 суток		-
Затруднение дыхания	Теофедрин, теofilлин ретарт по 0.2 1 раз в день	Л, С, Т	-
	Ингаляция солутана 2-3 раза в день		
Спазм голосовых мышц	Тепло на шею	С, Т	С, Т
	Атропин 1.0 0.1% п/к		
Кашель	Кодеин 0.015 3 р/д	С, Т	С, Т
	Банки (горчичники) чередовать		
Бронхоспазм	Хлористый кальций 5-10 мл 10% р-ра 1-2 р/сутки	-	С, Т
	Оксигенотерапия		
	Антибиотики	С, Т	
Стойкий бронхоспазм	При отсутствии эффекта от прошлых мероприятий	Т	Т
	Атропин 1.0 0.1% в/в		
	Преднизолон 30-60 мг в/в		
	Алупент 1.0 0.5% в/м		
Беспокойство и судороги	Трахеостомия	-	С, Т
	Феназепам (0.0005 г), седуксен, реланиум (0.005 г 2-3 р/день		
	Дроперидол от 1 до 10 мл 0.25% р-ра в/м	С, Т	С, Т
Отек гортани	ГОМК 5-20 мл 20% р-ра в/в струйно, медленно, под контролем дыхания	-	С, Т
	Трахеостомия	-	Т
	Санация трахеобронхиального дерева	-	
ТОЛ	Преднизолон от 300-400 мг до 2-3 г в/в	-	Т
	Стимуляция диуреза манитолом (1-2 г на кг веса в/в), мочевиной (30 г	-	

	с 200 мл 10% р-ра глюкозы в/в капельно)		
	Лазикс 40 мг и более	-	
	ИВЛ с ПДКВ 20-30 мм вод ст.	-	
	Гепарин по 5000 ЕД 4 р/дв/м	-	
	Оксигенотерапия с пеногасителями	-	
Симптомы ССН и поражения легких	Мезатон 1.0 1% в/м	-	C, T
	Дофамин 5.0 в 200 мл изотонического р-ра в/в капельно	-	
	Кордиамин 2.0 в/м	C. T	
	Кофеин 1.0 10% р-ра п/к		
	Сульфакамфокаин 2.0 10% р-ра в/м или п/к		-
	Эфедрин 5.0 в/м	-	C, T
	Строфантин 0.5 мл 0.25% р-ра в 20 мл 5% р-ра глюкозы	C. T	