

## ВОПРОСЫ К ТЕСТАМ

По теме 1.6 «Ядовитые технические жидкости»

1. Органические соединения, содержащие гидроксильную группу (ОН), соединенную с каким-либо углеводородным радикалом называются
2. Минимальная смертельная доза дихлорэтана
3. Время пребывания дихлорэтана в крови в высоких концентрациях составляет
4. При отравлении метиловым спиртом офтальмическая форма наблюдается при отравлении
5. При отравлении метиловым спиртом смерть наступает чаще всего в результате
6. Отравления метиловым спиртом легкой степени тяжести сопровождается
7. При отравлении метиловым спиртом в тяжелой степени этиловый спирт вводят из расчета
8. Этиленгликоль
9. Отравления этиленгликолем развивается при
10. Смертельная доза этиленгликоля составляет в среднем
11. Антидот при отравлении этиленгликолем
12. У тетраэтилсвинца
13. Тетраэтилсвинец попадает в организм через
14. Смертельная доза при приеме внутрь для человека тетраэтилсвинца составляет
15. Тетраэтилсвинец это
16. При поражении тетраэтилсвинцом нередко наблюдается триада симптомов:
17. Ощущение инородного тела (волоса) во рту, «размягчение зубов» отмечается при отравлении
18. В лечении пострадавшего от отравления метиловым спиртом обязательно должен принимать участие
19. При контакте с открытым пламенем, сильно нагретыми поверхностями разлагаются с образованием фосгена
20. Анилин (ксилидин) относится к группе