

ВОПРОСЫ К ТЕСТАМ

Тема 1.8. «Мероприятия медицинской службы в очагах химических и радиационных поражений»

1. Ядерная энергия основана на использовании трех делящихся радионуклидов. Один из их
2. При аварии на радиационно опасном объекте наибольшее значение в формировании дозы внешнего облучения имеет
3. На ранних этапах развития аварии преимущественно возникают
4. эффекты, которые развиваются и могут наблюдаться после накопления определенной дозы, т.е. возникают закономерно с развитием изменений в органах и тканях называются
5. Нестохастические эффекты имеют порог дозы, составляющий?
6. Острая лучевая реакция развивается при дозе облучения от
7. Острая лучевая болезнь развивается при дозе облучения более
8. Хроническая лучевая болезнь – это заболевание, которое возникает при длительном воздействии ионизирующего излучения при накоплении дозы
9. К стохастическим эффектам не относится
10. Согласно НРБ -99 величина канцерогенного риска составляет
11. Лица, которые непосредственного контакта с источниками ионизирующего излучения не имеют, но по условиям труда или проживания могут подвергнуться облучению относятся к
12. Предельно допустимая доза для профессионалов составляет для профессионалов составляет
13. Предельно допустимая доза для населения должна быть ниже естественного фона в
14. Укрытие в помещении на время прохождения факела аварийного выброса снижает дозу внешнего облучения в
15. Для защиты щитовидной железы от поступления радиоактивных изотопов йода необходимо принимать ежедневно йодид калия в дозе
16. Цистамин целесообразно принимать, если прогнозируемое получение дозы от проходящего факела составит более
17. Дети и женщины эвакуируются, если при нахождении на зараженной территории они могут получить за 10 дней дозу более
18. Население кроме женщин и детей, эвакуируется если при нахождении на зараженной территории они могут получить за 10 дней дозу более
19. К веществам замедленного действия относится
20. Количество вещества, вызывающее определенный токсический эффект называется