ВОПРОСЫ К ТЕСТАМ

По теме 1.5 «Токсические химические вещества нейротоксического действия»

1. Какое отравляющее вещество можно отнести к нейротоксической группе?
2. Запах у зомана
3. Какое отравляющее вещество относится к несмертельным ОВ?
4. Для дегазации поверхности, зараженной Vi-газами используется
5. Основным патогенетическим действием ФОС является:
6. Какой симптом отсутствует при мускариноподобном действии ФОС?
7. При поражении ДЛК продолжительность стадии психических расстройств составляет
8. По ведущему признаку поражения ФОВ не выделяют следующую форму
9. Фиксационная амнезия; суетливость, дезориентация, бессвязная речь; резкое психомоторное возбуждение с характерными галлюцинациями – клиническая картина поражения
10. По ведущему признаку поражения ФОВ чаще всего встречается:
11. Какого симптома нет при поражении ДЛК
12. Учащение дыхания, одышка, обильное выделение из носа, саливация встречается при
13. Сроки стационарного лечения пораженных легкой степени составляют:
14. При поражении Би-зет постепенное возвращение к нормальному состоянию возможно
15. При средней степени поражения ФОВ выделяют следующую клиническую форму
16. Би-зет имеет следующий запах
17. При снижении активности ХЭ снижена на 40-70% наблюдается по тяжести следующая форма поражения ФОВ
18. Судорожная стадия выделяется при поражении ФОВ
19. Антидот при поражении ФОВ
20. Начиная с этапа оказания первой врачебной помощи и на последующих этапах, в качестве антидота используется периферический М-холинолитик. Это
21. В/м или в/в 4-6 мл 0,1% р-ра атропина, а затем по 2 мл с интервалом 10 минут до состояния легкой переатропинизации. Эта схема используется при поражении
22. При поражении ФОВ состояние переатропинезации следует поддерживать в течение
23. К антидотам, действие которых связано с прямой нейтрализацией яда относится
24. При эвакуации пораженных ФОВ надо учитывать, что количество носилочных может составить
25. ДПС это

26.К психодислептикам относится
27.Очаг поражения при использовании ДЛК
28.При отравлении ДЛК какого периода нет?