

№	Этапы выполнения манипуляции	Содержание
1	Соблюдение требований по безопасности труда при выполнении услуги (обработка рук)	<p>До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты</p>
2	Выбор средств, для выполнения манипуляции	<p>8 чистых, сухих, стеклянных банок емкостью 200—500 мл с этикетками с указанием номера порции</p> <p>2—3 дополнительные банки</p> <p>Емкость для дезинфекции</p> <p>Контейнер для транспортировки ёмкостей с мочой</p> <p>Направление</p> <p>Перчатки нестерильные</p> <p>Непромокаемый фартук</p> <p>Жидкое мыло</p> <p>Полотенце</p> <p>Антисептик для обработки рук</p> <p>Дезинфицирующее средство</p>
3	Информирование пациента о выполняемой процедуре	<p>Письменного подтверждения согласия пациента или его родственников на данную процедуру не требуется, так как данная услуга не является потенциально опасной для жизни и здоровья пациента</p>
4	Алгоритм действий	<p>Алгоритм выполнения сбора мочи для исследования</p> <p><b>Подготовка к процедуре:</b></p> <p>1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель</p>

		<p>процедуры.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Провести инструктаж.</li> <li>3. Приготовить 8—10 чистых, стеклянных банок с этикетками, оформленными по форме, с указанием № порции и времени сбора мочи: 6—9, 9—12, 12—15, 15—18, 18—21, 21—24, 24—3, 3—6 часов следующего дня. Дополнительные банки оформить после сбора мочи.</li> </ol> <p><b>Выполнение процедуры</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В 6.00 утра пациента разбудить для опорожнения мочевого пузыря в унитаз.</li> <li>2. 1-я порция мочи собирается с 6 до 9 часов утра. Далее собирать мочу каждые 3 часа в отдельную банку.</li> <li>3. Банки с мочой хранить в прохладном месте закрытые крышками.</li> <li>4. При отсутствии мочи за временной промежуток, соответствующая банка остается пустой, на этикетке отметить «отсутствие порции мочи».</li> </ol> <p><b>Окончание процедуры</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В 6 часов утра следующего дня медицинской сестре надеть перчатки, фартук. Проконтролировать направления. Поставить банки в контейнер для транспортировки.</li> <li>2. Организовать доставку в лабораторию.</li> <li>3. Перчатки, фартук поместить в ёмкость для дезинфекции.</li> <li>4. Обработать руки гигиеническим способом.</li> <li>5. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую документацию.</li> </ol>
5	Особенности	За 3 дня до пробы необходимо отменить диуретики.

	выполнения методики	<p>Во время проведения пробы вести учёт количества выпитой жидкости за сутки.</p> <p>При частых мочеиспусканиях или выделении большого количества мочи ее следует собирать в дополнительную ёмкость и указывать временной промежуток на направлении.</p>
6	Оценка достигнутых результатов	<p>Получение необходимого материала для исследования</p> <p>Наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской документации.</p> <p>Своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем назначения).</p> <p>Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения</p> <p>Удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской услуги</p>
7	Оформление медицинской документации	направление