

Рецензия

на НИР ординатора на тему

«Клиническая значимость признаков соединительнотканной дисплазии в диагностике НДСТ у беременных».

Исполнитель – ординатор по специальности акушерство и гинекология кафедры онкологии, акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ИвГМА

Кириллова Ю.А.

Научный руководитель – к.м.н., доцент Керимкулова Н.В.

Работа представляет собой совместное исследование, выполненное на базе ОБУЗ «Родильный дом №4» г. Иваново, и в процессе диспансерного наблюдения женщин женских консультаций №5 и №6 г. Иваново. В исследование были включены 47 пациенток с НДСТ (основная группа) и 29 беременных без НДСТ (контрольная группа). НДСТ определяли на основании общепринятых диагностических критериев. Актуальность данной темы в последние годы приобретает все большее значение в работе акушеров-гинекологов. Цели и задачи научно-исследовательской работы по данной теме сформулированы четко. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений ввиду изучения достаточного количества клинического материала (76 беременных) с использованием современных методов исследования и тщательной обработки статистических данных. Выводы логично вытекают из полученных результатов. Научная новизна и практическая значимость исследования не вызывают сомнения. Автором получены данные, имеющие важное теоретическое значение.

В результате проведенного математического анализа определена связь между клинико-лабораторными данными и исходами беременности у женщин с НДСТ. Предложен способ диагностики НДСТ у беременных с учетом ранжирования значимости проявлений соединительнотканной дисплазии, включающий 16 высокоинформативных признаков 1-го и 2-го

ранга, представленных фенотипическими и висцеральными маркерами.

Определено значение биохимических анализов в прогнозировании акушерских осложнений у женщин с соединительнотканной дисплазией. Установлено, что снижение уровня магния в эритроцитах у беременных с НДСТ может служить прогностическим критерием возникновения ретрохориальных гематом и артериальной гипертензии, вызванной беременностью.

При комплексном исследовании полседов у родильниц с НДСТ, кроме общепатологических изменений, выявлены специфические для недифференцированной дисплазии соединительной ткани структурные перестройки, послужившие причиной преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, задержки роста плода и интранатальной асфиксии

Автор учел большую часть замечаний, высказанных научным руководителем. Работа оформлена в виде печатного варианта.

Оценка за НИР ординатора **«ОТЛИЧНО» - 90 баллов**

Научный руководитель:

к.м.н., доцент кафедры
Керимкулова Н.В.

