

ВАРИАНТ 1

1. Какая часть ушной раковины не поражается при ее перихондрите?
2. Характерна ли болезненность при надавливании на козелок в первую стадию острого гнойного среднего отита у взрослых?
3. Какие капли в ухо назначают в первую стадию острого гнойного среднего отита?
4. Две основные формы хронического гнойного среднего отита?
5. При какой форме хронического гнойного среднего отита показано преимущественно консервативное лечение?
6. Характерно ли снижение слуха в первую стадию острого гнойного среднего отита?
7. В какую стадию острого гнойного среднего отита обычно наблюдаются симптомы интоксикации?
8. Что такое петрозит?
9. Два основных рентгенологических признака эпитимпанита?
10. При диффузном или ограниченном лабиринтите показано преимущественно консервативное лечение?

ВАРИАНТ 2

1. В каком отделе наружного слухового прохода возникают фурункулы?
2. Для детей какого возраста характерна болезненность при надавливании на козелок в первую стадию острого гнойного среднего отита?
3. Какие капли в ухо назначают во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
4. Для какой формы хронического гнойного среднего отита характерно доброкачественное течение?
5. Что такое тимпанопластика?
6. Основной субъективный симптом в первую стадию острого гнойного среднего отита?
7. Отоскопическая картина во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
8. Какая операция производится при остром гнойном среднем отите, осложненном мастоидитом?
9. Основной рентгенологический признак мезотимпанита?
10. Какой нистагм характерен для диффузного лабиринтита?

ВАРИАНТ 3

1. Характерна ли болезненность при надавливании на козелок при наружном отите?
2. Отоскопическая картина в первую стадию острого гнойного среднего отита?
3. В какую стадию острого гнойного среднего отита производят парацентез барабанной перепонки?
4. Какая локализация перфорации барабанной перепонки характерна для мезотимпанита?
5. Какая операция проводится при хроническом гнойном эптитимпаните?
6. Звукопроводение или звуковосприятие нарушается в первую стадию острого гнойного среднего отита?
7. Какие капли в нос назначают при остром гнойном среднем отите?
8. Основные три признака, характерные для хронического гнойного среднего отита?
9. При какой форме хронического гнойного среднего отита обычно возникает холестеатома?
10. При диффузном или ограниченном лабиринтите показано преимущественно оперативное лечение?

ВАРИАНТ 4

1. Основной симптом серной пробки?
2. Какие изменения барабанной перепонки характеризуют начало второй стадии острого гнойного среднего отита?
3. В каком квадранте барабанной перепонки производят парацентез?
4. Характерно ли снижение слуха для мезотимпанита?
5. При какой форме хронического гнойного среднего отита показано преимущественно оперативное лечение?
6. Наиболее частый путь проникновения инфекции в среднее ухо?
7. Звукопроводение или звуковосприятие нарушается во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
8. Какой дополнительный метод исследования наиболее часто используется для диагностики мастоидита?
9. Какие ткани вовлекаются в патологический процесс при мезотимпаните?
10. Какой нистагм характерен для ограниченного лабиринтита?

ВАРИАНТ 5

1. Основной метод удаления серной пробки?
2. Два основных объективных симптома во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
3. Осложнением какого заболевания обычно является мастоидит?
4. Какие ткани вовлекаются в патологический процесс при эптитимпаните?
5. В стадию ремиссии или обострения хронического гнойного среднего отита проводится тимпанопластика?
6. Основные пути проникновения инфекции в среднее ухо?
7. Характерна ли боль во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
8. Признаком чего является флюктуация при пальпации сосцевидного отростка?
9. Какая локализация перфорации барабанной перепонки характерна для эптитимпанита?
10. Осложнением какого заболевания обычно является ограниченный лабиринтит?

ВАРИАНТ 6

1. Чем можно размягчить твердую серную пробку?
2. Характерно ли снижение слуха во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
3. Основной отоскопический признак мастоидита?
4. Для какой формы хронического гнойного среднего отита характерно недоброкачественное течение?
5. Виды лабиринтитов в зависимости от пути проникновения инфекции?
6. Сколько стадий выделяют в течении острого гнойного среднего отита?
7. Характерна ли болезненность при надавливании на козелок во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
8. С каким заболеванием наиболее часто приходится дифференцировать мастоидит?
9. Для какой формы хронического гнойного среднего отита характерно наличие неприятного запаха отделяемого из уха?
10. Виды диффузных лабиринтитов по характеру воспалительного процесса?

ВАРИАНТ 7

1. Основные пути проникновения инфекции в среднее ухо?
2. Характерна ли боль во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
3. Признаком чего является флюктуация при пальпации сосцевидного отростка?
4. Какая локализация перфорации барабанной перепонки характерна для эптитимпанита?
5. Осложнением какого заболевания обычно является ограниченный лабиринтит?
6. Чем можно размягчить твердую серную пробку?
7. Характерно ли снижение слуха во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
8. Основной отоскопический признак мастоидита?
9. Для какой формы хронического гнойного среднего отита характерно недоброкачественное течение?
10. Виды лабиринтитов в зависимости от пути проникновения инфекции?

ВАРИАНТ 8

1. Наиболее частый путь проникновения инфекции в среднее ухо?
2. Звукопроводение или звуковосприятие нарушается во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
3. Какой дополнительный метод исследования наиболее часто используется для диагностики мастоидита?
4. Какие ткани вовлекаются в патологический процесс при мезотимпаните?
5. Какой нистагм характерен для ограниченного лабиринтита?
6. Основной метод удаления серной пробки?
7. Два основных объективных симптома во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
8. Осложнением какого заболевания обычно является мастоидит?
9. Какие ткани вовлекаются в патологический процесс при эптитимпаните?
10. В стадию ремиссии или обострения хронического гнойного среднего отита проводится тимпанопластика?

ВАРИАНТ 9

1. Сколько стадий выделяют в течении острого гнойного среднего отита?
2. Характерна ли болезненность при надавливании на козелок во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
3. С каким заболеванием наиболее часто приходится дифференцировать мастоидит?
4. Для какой формы хронического гнойного среднего отита характерно наличие неприятного запаха отделяемого из уха?
5. Виды диффузных лабиринтитов по характеру воспалительного процесса?
6. Основной симптом серной пробки?
7. Какие изменения барабанной перепонки характеризуют начало второй стадии острого гнойного среднего отита?
8. В каком квадранте барабанной перепонки производят парацентез?
9. Характерно ли снижение слуха для мезотимпанита?
10. При какой форме хронического гнойного среднего отита показано преимущественно оперативное лечение?

ВАРИАНТ 10

1. Основной субъективный симптом в первую стадию острого гнойного среднего отита?
2. Отоскопическая картина во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
3. Какая операция производится при остром гнойном среднем отите, осложненном мастоидитом?
4. Основной рентгенологический признак мезотимпанита?
5. Какой нистагм характерен для диффузного лабиринтита?
6. Характерна ли болезненность при надавливании на козелок при наружном отите?
7. Отоскопическая картина в первую стадию острого гнойного среднего отита?
8. В какую стадию острого гнойного среднего отита производят парацентез барабанной перепонки?
9. Какая локализация перфорации барабанной перепонки характерна для мезотимпанита?
10. Какая операция проводится при хроническом гнойном эптитимпаните?

ВАРИАНТ 11

1. Характерно ли снижение слуха в первую стадию острого гнойного среднего отита?
2. В какую стадию острого гнойного среднего отита обычно наблюдаются симптомы интоксикации?
3. Что такое петрозит?
4. Два основных рентгенологических признака эптитимпанита?
5. При диффузном или ограниченном лабиринтите показано преимущественно консервативное лечение?
6. В каком отделе наружного слухового прохода возникают фурункулы?
7. Для детей какого возраста характерна болезненность при надавливании на козелок в первую стадию острого гнойного среднего отита?
8. Какие капли в ухо назначают во вторую стадию острого гнойного среднего отита?
9. Для какой формы хронического гнойного среднего отита характерно доброкачественное течение?
10. Что такое тимпанопластика?

ВАРИАНТ 12

1. Звукопроводение или звуковосприятие нарушается в первую стадию острого гнойного среднего отита?
2. Какие капли в нос назначают при остром гнойном среднем отите?
3. Основные три признака, характерные для хронического гнойного среднего отита?
4. При какой форме хронического гнойного среднего отита обычно возникает холестеатома?
5. При диффузном или ограниченном лабиринтите показано преимущественно оперативное лечение?
6. Какая часть ушной раковины не поражается при ее перихондрите?
7. Характерна ли болезненность при надавливании на козелок в первую стадию острого гнойного среднего отита у взрослых?
8. Какие капли в ухо назначают в первую стадию острого гнойного среднего отита?
9. Две основные формы хронического гнойного среднего отита?
10. При какой форме хронического гнойного среднего отита показано преимущественно консервативное лечение?