

Алгоритм выполнения первичной хирургической обработки раны

№	Действия	1*	0,5**	0***
1.	Подготовил оснащение: Для туалета раны (антисептический раствор, перевязочный материал, ножницы, зажимы Микулича, пинцет). Для проведения местного обезболивания (одноразовый шприц, новокаин 0,25% или 0,5%, возможен другой анестетик). Для проведения процедуры (стерильный перевязочный материал и пеленки, скальпель, кровоостанавливающие зажимы Бильрота, лигатуры, хирургические иглы с иглодержателем, дренажные трубки).	10	5	0
2.	– Представился пациенту. Уточнил ФИО пациента, его самочувствие. – Убедился в наличии информированного согласия. – Объяснил цель и ход процедуры.	4 4 4	2 2 2	0 0 0
3.	– Обработал руки, оделся как на операцию.	2	1	0
4.	– Обработал кожу вокруг раны антисептиком троекратно по хирургическим принципам, при необходимости кожу вокруг раны предварительно побрил.	6	3	0
5.	– Отграничил операционное поле стерильным бельем.	6	3	0
6.	– Выполнил местное обезболивание раны.	6	3	0
7.	- Промыл рану дезраствором (раствором хлоргексидина 0.05%, перекиси водорода 3%).	8	4	0
8.	- Удалил инородные тела (при их наличии) раневого канала	8	4	0
9.	- Выполнил иссечение нежизнеспособных тканей (с учетом степени поражения тканей, сосудов, наличия "карманов").	8	4	0
10.	Остановил кровотечение из операционной раны.	8	4	0
11.	-Установил дренаж (перчаточный выпускник или дренажную трубку по показаниям) ко дну раны.	4	2	0
12.	- Выполнил закрытие раны (ушил узловыми швами в первые 24 часа, при огнестрельной ране швы не накладывал).	6	3	0
13.	– Наложил повязку, при необходимости выполнил иммобилизацию.	6	3	0
14.	– Назначил иммунизацию против столбняка и бешенства – согласно инструкции.	6	3	0
15.	- Сделал запись о выполнении в медицинской документации.	4	2	0
	Итого			

* - Выполнил полностью

** - Выполнил не полностью/с ошибками

*** - Не выполнил