

Вирусные гепатиты

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1. Характерными особенностями ВГС-инфекции являются:
 - a) циркуляция вируса в крови в минимальных концентрациях
 - b) циркуляция вируса в крови в максимальных концентрациях
 - c) высокая степень гетерогенности ВГС
 - d) высокая иммуногенность ВГС
 - e) отсутствие полноценного защитного иммунитета
2. Источниками инфекции при вирусных гепатитах В и С являются лица, переносящие острые и хронические формы инфекции
 - a) манифестно
 - b) стерто
 - c) бессимптомно
3. Эффективными противоэпидемическими мероприятиями при гепатите В являются
 - a) исключение передачи инструментальным путем
 - b) тщательный отбор доноров крови
 - c) контроль препаратов крови, иммуноглобулина, интерферона на наличие маркеров ГВ
 - d) правильная обработка сточных вод
 - e) соблюдение санитарно-гигиенических правил в семьях хронических носителей ВГВ
 - f) проведение вакцинации групп риска ВГВ

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

4. С высокой степенью вероятности можно говорить о переходе хронического ВГС в цирроз при значении отношения уровня АСТ к уровню АЛТ (индекс АСТ/АЛТ)
 - a) выше или равным 1
 - b) ниже 1

5. Наиболее массивное и постоянное выделение вируса ГА наблюдается в течение
- a) всего инкубационного периода
 - b) желтушного периода
 - c) последних 7-10 дней инкубации и всего преджелтушного периода
 - d) последних 15-20 дней инкубации
 - e) реконвалесценции
6. После перенесения манифестной формы острого ГВ хронический гепатит развивается у
- a) 1% переболевших
 - b) 5-10% переболевших
 - c) 30% переболевших
 - d) 50% переболевших
 - e) не формируется
7. «Золотым» стандартом диагностики гепатита А является
- a) выделение вируса ГА на клеточной культуре
 - b) выявление антигена вируса ГА в фекалиях
 - c) выявление антител к вирусу ГА класса IgM в сыворотке крови
 - d) выявление антител к вирусу ГА класса IgG в сыворотке крови
 - e) выявление антител к вирусу ГА класса IgA в сыворотке крови
8. Вакцина против гепатита А представляет собой
- a) рекомбинантный белок вируса
 - b) синтетические препараты вируса
 - c) аттенуированный вирус
 - d) инактивированный вирус
 - e) сочетание 1 и 2

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

9. Вирус гепатита

Геном

- а) ДНК
- б) РНК

- 1. А-
- 2. В-
- 3. С-
- 4. D-
- 5. Е-
- 6. F-
- 7. G-

10. Вирусный гепатит

Характерное начало

- а) постепенное
- б) острое

- 1. А-
- 2. В-
- 3. С-
- 4. D-
- 5. Е-

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

11. Цель эпиднадзора вирусным гепатитом А

- а) предупреждение заболеваний в отдельных группах населения
- б) снижение заболеваемости совокупного населения
- с) предупреждение формирования хронических форм
- д) предупреждение развития цирроза и рака печени

12. Инфицирование вирусом гепатита С может привести к исходам

- а) реконвалесценции
- б) бессимптомному носительству
- с) ХГС
- д) циррозу печени, приводящему к терминальному поражению печени (ТПП)

13. Вакцинация против гепатита В в России должна и может проводиться

- a) в соответствии с Законом страны и календарем прививок
- b) по желанию населения
- c) по эпидемическим показаниям, детям
- d) по эпидемическим показаниям взрослому населению

14. Источниками ВГВ в стационарах могут являться

- a) больные острой формы заболевания
- b) больные хроническим активным гепатитом
- c) больные хроническим персистирующим гепатитом
- d) реконвалесценты
- e) вирусоносители

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

15. После проведенной вакцинации против ВГВ среди привитых лиц заболеваемость

- a) не регистрируется
- b) в 10-15 раз меньше, чем у непривитых лиц
- c) не отличается от заболеваемости непривитых лиц

16. Наиболее интенсивный эпидемический процесс вирусного ГЕ чаще регистрируется среди лиц следующих возрастных групп

- a) до 2-х лет
- b) 1-2 года
- c) 3-6 лет
- d) 7-14 лет
- e) 20-39 лет

17. При гепатите С наиболее ранними антителами, которые можно обнаружить с помощью современных диагностических препаратов, являются

- a) анти-NSS

- b) анти-M34
- c) анти-M33
- d) анти-M82
- e) анти-env
- f) анти-core

18. Вакцина против гепатита В представляет собой

- a) рекомбинантный белок вируса
- b) синтетические пептиды вируса
- c) аттенуированный вирус
- d) инактивированный вирус
- e) сочетание 1 и 2

19. Источником вирусного гепатита А является

- a) больной вирусным гепатитом А
- b) хронический носитель вирусного гепатита А
- c) грызуны

20. Больной вирусным гепатитом А наиболее заразителен

- a) в конце инкубационного периода
- b) при появлении желтухи
- c) в период реконвалесценции

21. При вирусном гепатите В наиболее эпидемиологически значимыми источниками инфекции являются

- a) хронический больной
- b) реконвалесцент и хронический носитель вируса
- c) хронический больной и хронический носитель вируса

22. Максимальный инкубационный период болезни при вирусных гепатитах В и С составляет

- a) 50 дней
- b) 2 мес
- c) 6 мес

Правильные ответы:

- 1) a, c, e
- 2) a, b
- 3) a, c, f
- 4) a
- 5) c
- 6) b
- 7) c
- 8) a
- 9) 1б, 2а, 3б, 4б, 5б, 6б, 7б
- 10) 1б, 2а, 3а, 4б, 5б
- 11) a
- 12) a, c
- 13) a, b, c, d
- 14) a, b, c, d
- 15) a
- 16) e
- 17) f
- 18) e
- 19) a
- 20) a
- 21) c
- 22) c