

Тестовые задания к теме «Дифтерия»

1. К какой группе относится возбудитель дифтерии:
 - A. Коринобактерии
 - B. В. Бифидобактерии
 - C. С. Риккетсии
 - D. Листерии
 - E. Иерсинии

2. Какая из клинических форм дифтерии встречается наиболее часто:
 - A. Дифтерия миндалин
 - B. Дифтерия гортани
 - C. Дифтерия глаз
 - D. Дифтерия носа
 - E. Дифтерия половых органов

3. Крупозное фибринозное воспаление при дифтерии развивается:
 - A. В гортани
 - B. На миндалинах
 - C. На небных дужках
 - D. На мягком небе
 - E. В носу

4. Какой из перечисленных симптомов характерен для дифтерии:
 - A. Резкие боли при глотании
 - B. Болезненность регионарных лимфоузлов
 - C. Желтого цвета гной в лакунах миндалин
 - D. Лихорадочный румянец
 - E. Фибринозный характер налета

5. Какой из ниже перечисленных видов терапии является основным при тяжелых формах дифтерии:
 - A. Введение противодифтерической сыворотки
 - B. Введение антибиотиков
 - C. Инфузионная терапия
 - D. Десенсибилизирующая терапия
 - E. Кортикостероидная терапия

6. Главным критерием тяжести дифтерии является:
 - A. Выраженность интоксикации
 - B. Характер налета
 - C. Распространение налетов
 - D. Выраженность отека подкожной клетчатки
 - E. Все ответы верны

7. Укажите максимальную длительность инкубационного периода при дифтерии:

- A. До 7 дней
- B. До 14 дней
- C. До 17 дней
- D. До 21 дня
- E. До 45 дней

8. Укажите, с какими заболеваниями необходимо прежде всего дифференцировать дифтерию:

- A. Лакунарная ангина
- B. Корь
- C. Менингококковая инфекция
- D. Паротитная инфекция
- E. Шейный лимфаденит

9. Какие исследования необходимо провести с целью дифференциальной диагностики дифтерии миндалин и лакунарной ангины:

- A. Мазок из зева и носа на BL
- B. Гемокультура
- C. Смыв из зева и носа на вирус
- D. Мазок из зева и носа на флору
- E. Бактериоскопия мазка из зева и носа

10. Для вакцинации против дифтерии применяется:

- A. Ослабленная дифтерийная палочка
- B. Убитая дифтерийная палочка
- C. Дифтерийный токсин
- D. Дифтерийный анатоксин
- E. Все ответы верны

11. При каких условиях можно выписать ребенка с бактерионосительством коринобактерии *gravis*, токсигенный штамм:

- A. Отрицательный контрольный посев из носа и носоглотки на BL
- B. Отсутствие нарастания титра антител с дифтерийным антигеном
- C. Отсутствие жалоб
- D. Отсутствие изменений на миндалинах
- E. Пребывание в стационаре свыше 7 дней

12. Какое наиболее частое осложнение при дифтерии:

- A. Миокардит
- B. Эндокардит
- C. Миокардиодистрофия
- D. Менингит
- E. Сепсис

13. Назовите сроки начала вакцинации против дифтерии:

- A. 2 мес.
- B. 3 мес.
- C. 6 мес.
- D. 12 мес.
- E. 18 мес.

14. Укажите, как правильно обследовать контактных в очаге дифтерии:

- A. Мазок из зева и носа на ВЛ всем контактным
- B. Мазок только из зева всем контактным
- C. Мазок из зева и носа на ВЛ только детям
- D. Мазок только из носа всем контактным
- E. Все ответы неверны

15. Ведущим звеном в патогенезе дифтерии является :

- A. Токсемия
- B. Бактериемия
- C. Сенсибилизация
- D. Нарушение гомеостаза
- E. Все ответы верны

16. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику при дифтерии глаз:

- A. Аденовирусная инфекция
- B. Грипп
- C. Риновирусная инфекция
- D. РС-инфекция
- E. Парагрипп

17. Назовите дозу антитоксической противодифтеринной сыворотки для лечения легкой формы дифтерии миндалин:

- A. 10-20 тыс ЕД
- B. 30-40 тыс ЕД
- C. 50-80 тыс ЕД
- D. 90-120 тыс ЕД
- E. 120-150 тыс ЕД

18. Назовите дозу антитоксической противодифтеринной сыворотки для лечения среднетяжелой формы дифтерии миндалин:

- A. 10-20 тыс ЕД
- B. 30-40 тыс ЕД
- C. 50-80 тыс ЕД
- D. 90-120 тыс ЕД
- E. 120-150 тыс ЕД

19. Назовите дозу антитоксической противодифтерийной сыворотки для лечения тяжелой формы дифтерии миндалин:

- A. 10-20 тыс ЕД
- B. 30-40 тыс ЕД
- C. 50-80 тыс ЕД
- D. 90-120 тыс ЕД
- E. 120-150 тыс ЕД