

Тесты на тему: «Инфекционный мононуклеоз»

1. Возбудителями инфекционного мононуклеоза являются:

- а) *Listeria monocitogenes*
- б) Epstein-Barr virus
- в) Varicella-Zoster virus
- г) цитомегаловирус
- д) HHV - 6

2. При инфекционном мононуклеозе выявляются в периферической крови:

- а) нейтрофилез + лимфопения
- б) лимфопения + атипичные мононуклеары
- в) атипичные мононуклеары + лимфоцитоз
- г) лимфоцитоз + эозинофилия

3. При инфекционном мононуклеозе рекомендуют:

- а) антигистаминные препараты
- б) сосудосуживающие капли в нос
- в) ампициллин
- г) преднизолон
- д) иммуноглобулин

4. Типичными симптомами инфекционного мононуклеоза являются:

- а) лихорадка
- б) ангина
- в) увеличение шейных лимфоузлов
- г) обильные выделения из носа
- д) увеличение печени и селезенки

5. Наиболее значимыми диагностическими тестами инфекционного мононуклеоза являются:

- а) обнаружение атипичных мононуклеаров
- б) обнаружение антител к вирусу Эпштейна-Барр
- в) изменение активности трансаминаз
- г) реакции гетерогемагглютинации

6. Для инфекционного мононуклеоза характерно преимущественное увеличение:

- А) переднешейных лимфоузлов
- Б) заднешейных лимфоузлов

7. Пути передачи ВЭБ:

- А) воздушно-капельный
- Б) фекально-оральный
- В) контактно-бытовой
- Г) трансфузионный
- Д) вертикальный

8. Укажите маркеры активной ВЭБ-инфекции:

- А) IgG VCA
- Б) IgM VCA
- В) АТ к EBNA

9. Укажите маркеры перенесенной ВЭБ-инфекции:

- А) IgG VCA
- Б) IgM VCA
- В) АТ к EBNA

10. Для инфекционного мононуклеоза у детей раннего возраста характерны:

- А) насморк
- Б) высыпания на коже
- В) диарея
- Г) менингит

