

1. ЗАРАЗИТСЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА «А» МОЖНО ПРИ:

1. контакте с больным человеком
2. при переливании крови
3. при укусе насекомых
4. при медицинских манипуляциях

2. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ ГЕПАТИТЕ А:

1. 2-7 дней
2. 7-17 дней
3. 14-60 дней
4. 1-21 день

3. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПРЕДЖЕЛТУШНОГО ПЕРИОДА НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А:

1. артралгический
2. диспепсический
3. катаральный
4. астеновегетативный

4. КАКИЕ МАРКЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А:

1. анти-НАVIgM
2. анти-НВsAgIgM
3. анти-НСVIgM
4. анти- НВеAgIgM

5. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ БЕЗЖЕЛТУШНОЙ ФОРМЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА:

1. гипербилирубинемия
2. повышение уровня трансаминаз
3. повышение щелочной фосфатазы
4. повышение уровня холестерина

6. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДЖЕЛТУШНОГО ПЕРИОДА ПРИ ТИПИЧНОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А СОСТАВЛЯЕТ:

1. 1-3 дня
2. 4-7 дней
3. 8-14 дней
4. 15-20 дней

7. В КАКОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А:

1. от 0 до 1-го года
2. от 1-го года до 3-х
3. от 3-х до 5-ти
4. от 5-ти до 14-ти лет

8. ОСНОВНЫМ ВИДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЛЕГКИХ ФОРМАХ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А ЯВЛЯЕТСЯ:

1. соблюдение режима и диеты
2. применение гепатопротекторов
3. инфузионная терапия
4. ферментные препараты

9. КАКОЙ ИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ВАЖЕН ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА:

1. повышение билирубина
2. повышение трансаминаз
3. повышение тимоловой пробы
4. повышение холестерина

10. КАКОВЫ ИСХОДЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А:

1. выздоровление
2. хронический вирусный гепатит
3. цирроз печени
4. острая печеночная недостаточность

11. После перенесенного вирусного гепатита В прививки противопоказаны:

- а) в течение 3 месяцев
- б) в течение 6 месяцев
- в) в течение 12 месяцев
- г) в течение 2 лет

12. Укажите наиболее приемлемую схему иммунизации против вирусного гепатита «В» детей от матери, больной вирусным гепатитом В, или вирусоносителя:

- а) вакцинация в первые 24 часа жизни, ревакцинация - через 1 месяц, 2 месяца, 12 месяцев
- б) вакцинация 4-5 месяц, ревакцинация - 6 и 12 месяцев
- в) вакцинация в 1 месяц жизни, ревакцинация через 6 месяцев
- г) вакцинация в 1 месяц жизни, ревакцинация через год
- д) вакцинация не проводится

13. Назовите характерный синдром преджелтушного периода при вирусном гепатите «В»:

- а) латентный
- б) артралгический
- в) гриппоподобный
- г) болевой
- д) смешанный

14. Основном фактором передачи вирусного гепатита «В» является:

- а) вода
- б) кровь и ее компоненты
- в) грязные руки и предметы
- г) продукты питания
- д) лекарственные препараты

15. Каким препаратом можно проводить вакцинацию против вирусного гепатита «В»?

- а) вакцина Энжерикс-В
- б) реальдерон
- в) интрон
- г) Энцевир
- д) гаммаглобулин

16. Укажите длительность поствакцинального иммунитета при вирусном гепатите «В»:

- а) не менее 1 года
- б) не более 1 года
- в) не менее 7 лет

- г) в течение всей жизни
- д) правильного ответа нет

17. При остром вирусном гепатите «В» выявляются:

- а) анти-HAV IgM
- б) анти-HCVIgM
- в) HbsAg , анти-HBsAg IgM, анти- HBeAg IgM, анти- HBcorAg IgM
- г) анти- HDVIgM
- д) анти-HEV IgM

18. Укажите серологические маркеры, характерные для вирусного гепатита «В» в периоде реконвалесценции (через 3-6 месяцев после выписки):

- а) анти-HBcor IgG, анти-HBs Ig G
- б) анти-HBcor Ig M
- в) анти-HCV (суммарные)
- г) HBsAg
- д) HBeAg

19. Укажите неверное утверждение в отношении вирусного гепатита №» «В»:

- а) инкубационный период длится от 2 до 6 месяцев
- б) с появлением желтухи ухудшается самочувствие
- в) обнаружение в крови анти-HAV IgM - достоверный признак ВГВ
- г) желтуха нарастает постепенно
- д) летальность составляет 0,4%

20. Какие препараты предпочтительнее при лечении хронических вирусных гепатитов В и С?

- а) ферменты
- б) спазмолитики
- в) гепатопротекторы
- г) глюкокортикоиды
- д) противовирусные средства

21. Назовите нехарактерный признак вирусного гепатита «В»:

- а) постепенное начало
- б) хронизация патологического процесса
- в) ухудшение состояния при переходе в желтушный период
- г) нормальные показатели тимоловой пробы
- д) гриппоподобный синдром преджелтушного периода

22. Каковы меры экстренной профилактики вирусного гепатита В?

- а) ввести иммуноглобулин внутримышечно после контакта и через 20-30 дней
- б) срочно провести вакцинацию против гепатита
- в) ввести дозу иммуноглобулина с антителами к HbsAg
- г) одновременно ввести иммуноглобулин и вакцину
- д) ничего не делать

23. Назовите пути передачи ВГС:

- А. воздушно-капельный
- Б. парентеральный
- В. фекально-оральный
- Г. Вертикальный
- Д. половой

24. Гепатит С подтверждается обнаружением в крови:
- А. анти-СМV
 - Б. анти-НСV
 - В. анти-НВс IgG

25. При вирусном гепатите С часто отмечается:
- А. фульминантная форма
 - Б. хронизация процесса
 - В. выздоровление

26. Вирус гепатита С относится к семейству:
- А. флавивирусов
 - Б. гепаатовирусов
 - В. гепадновирусов
 - Г. Пикорнавирусов

27. Особенности патогенеза гепатита С (верно все, к р о м е):
- А. прямое ЦПД вируса на гепатоциты
 - Б. вирогения
 - В. длительная персистенция
 - Г. преимущественно хронизация заболевания
 - Д. высокая вероятность осложнений: цирроза и карциномы печени

28. Серологические маркеры вируса гепатита С (верно все, к р о м е):
- А. антитела к core антигену НСV
 - Б. **антитела к РНК**
 - В. РНК вируса
 - Г. антитела к NS антигенам НСV
 - Д. антитела к E1/E2 антигенам НСV

29. Для скринингового определения серологических маркеров вируса гепатита «С» используют:
- А. РСК
 - Б. ИФА
 - В. РТГА
 - Г. ПЦР
 - Д. Иммуноблотинг

30.Профилактика гепатита С включает все, к р о м е:

- А. отказа от курения
- Б. пропаганды здорового образа жизни (в первую очередь, отказ от наркотиков)
- В. качественной стерилизации
- Г. проверки донорской крови
- Д. использования одноразовых шприцев

31.Специфическая профилактика гепатита С:

- А. плазменные вакцины
- Б. рекомбинантные вакцины
- В. не разработана
- Г. интерферон
- Д. индукторы интерферона