

Тесты на тему: Полиомиелит

1. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПОЛИОМИЕЛИТА:

- А. вызывается вирусом,
- Б. переносчиком являются иксодовые клещи,
- В. в настоящее время встречается редко,
- Г. может приводить к инвалидизации,
- Д. основной путь профилактики – вакцинация.

2. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПОЛИОМИЕЛИТА:

- А. распространен повсеместно,
- Б. вызывается особым видом риккетсий,
- В. по механизму передачи относится к кишечным инфекциям,
- Г. протекает, главным образом, в форме энтероколита,
- Д. лечится препаратами тетрациклинового ряда.

3. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ПОЛИОМИЕЛИТ ПРОТЕКАЕТ В СЛЕДУЮЩИХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ:

- А. абортивной,
- Б. менингеальной,
- В. спинальной,
- Г. энцефалитической,
- Д. бульбарной.

4. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. МЕНИНГЕАЛЬНАЯ ФОРМА ПОЛИОМИЕЛИТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- А. высокой лихорадкой,
- Б. менингеальным синдромом,
- В. корешковыми болями,
- Г. расстройством сознания,
- Д. лимфоцитарным плеоцитозом цереброспинальной жидкости.

5. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ПАРАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА ПОЛИОМИЕЛИТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- А. расстройствами сознания,
- Б. нарушением всех видов чувствительности,
- В. развитием спастических параличей,
- Г. симметричностью поражения мышц,
- Д. частичным восстановлением функций парализованных мышц.

6. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПОЛИОМИЕЛИТА:

- А. наиболее тяжело протекает бульбарная форма болезни,
- Б. характерна асимметричность параличей и парезов,
- В. паралитический синдром развивается внезапно с первого дня болезни,
- Г. частичное восстановление функций парализованных мышц начинается с конца 2 недели болезни,
- Д. после перенесенной паралитической формы болезни остается стойкая атрофия мышц.

7. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПОЛИОМИЕЛИТА:

- А. прогностически опасная бульбарная форма болезни,
- Б. причиной смерти могут быть нарушения дыхания,
- В. из неспецифических осложнений чаще всего наблюдается пневмония,
- Г. диагноз подтверждается РСК с парными сыворотками,
- Д. для лечения используют ацикловир.

8. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПОЛИОМИЕЛИТА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ СО СЛЕДУЮЩИМИ БОЛЕЗНЯМИ:

- А. миелитом,
- Б. полиневритом,
- В. столбняком,
- Г. дифтерийной полиневропатией,
- Д. полирадикулоневритом.

9. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ПОЛИОМИЕЛИТА:

- А. вакцинация – основной метод профилактики,
- Б. применяют живую вакцину,
- В. вакцинация начинается с трехмесячного возраста, проводится трехкратно,
- Г. вакцина вводится внутримышечно,
- Д. ревакцинация проводится четырехкратно.