

Рубежный контроль успеваемости - РКУ (Итоговое занятие)
Тесты I Вариант

1. ОСМОТРЕВ 2 – ЛЕТНЕГО РЕБЁНКА, КАШЛЯЩЕГО В ТЕЧЕНИЕ 3 НЕДЕЛЬ, ВРАЧ ЗАПОДОЗРИЛ КОКЛЮШ. ПО КАКИМ СИМПТОМАМ?

- а) цианоз носогубного треугольника
- б) проявления экссудативного диатеза на коже
- в) температура 39°C
- г) рассеянные сухие хрипы в лёгких
- д) кровоизлияния в склеру и язвочка на уздечке языка

2. КАКИЕ СИМПТОМЫ НЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ СКАРЛАТИНЫ У РЕБЁНКА?

- а) яркая гиперемия зева
- б) «малиновый язык»
- в) мелкоточечная сыпь
- г) фебрильная температура
- д) локализованные хрипы в лёгких

3. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ РАВЕН:

- а) 2-5 дням
- б) 30-35 дням
- в) 11-21 дню
- г) 7 дням
- д) 1 дню

4. БОЛЬНОЙ КОРЬЮ РЕБЁНОК ЗАРАЗЕН В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:

- а) в первые 5 дней инкубационного периода
- б) в течение всего катарального периода
- в) до конца клинических проявлений заболевания
- г) только при наличии сыпи
- д) только при появлении осложнений

5. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА СОСТАВЛЯЕТ:

- а) до 7 дней
- б) 7-14 дней
- в) 11-21 день
- г) 15-25 дней
- д) до 28 дней

6. КАКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА?

- а) полиаденит
- б) конъюнктивит
- в) кожные высыпания
- г) ринит
- д) трахеобронхит

7. У РЕБЁНКА 2 ЛЕТ С ОРВИ НОЧЬЮ ПОЯВИЛСЯ ЛАЮЩИЙ КАШЕЛЬ, ОХРИПЛОСТЬ, ОДЫШКА С УДЛИНЁННЫМ ВДОХОМ. КАКОЙ ДИАГНОЗ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТЕН?

- а) острая пневмония
- б) острый бронхит
- в) бронхиальная астма

- г) острый стенозирующий ларинготрахеит
- д) острый тонзиллит

8. ДЛЯ РОТОВИРУСНОЙ ДИАРЕИ У РЕБЁНКА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ СИМПТОМОВ:

- а) обильный водянистый стул, жёлтого цвета, метеоризм, боли в животе, рвота, тошнота, эксикоз
- б) тошнота, рвота, стул со слизью и прожилками крови
- в) водянистый зловонный стул, пенистый, с густой мутной слизью, рвота, тошнота, эксикоз
- г) жидкий зеленоватой окраски стул, диффузные боли в животе

9. ГЕНЕРАЛИЗОВАННУЮ ФОРМУ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА У ДЕТЕЙ ОТ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ОТЛИЧАЮТ СИМПТОМЫ:

- а) рвота
- б) боли в животе
- в) жидкий стул
- г) гепатоспленомегалия

10. КАКАЯ ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ У ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ?

- а) дизентерия
- б) ротовирусная инфекция
- в) холера
- г) стафилококковый энтероколит
- д) кампилобактериоз

11. ДЛЯ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ:

- а) фибринозные налёты на нёбных миндалинах, не выходящие за их пределы; умеренная болезненность при глотании
- б) фибринозные налёты на нёбных миндалинах, выходящие за их пределы – на дужки, мягкое нёбо; тризм жевательной мускулатуры
- в) температура тела 39-40°C; фибринозные налёты на нёбных миндалинах, дужках, мягком нёбе
- г) застойная гиперемия зева; фибринозные налёты на нёбных миндалинах, дужках, мягком нёбе

12. ДЛЯ ДИЗЕНТЕРИИ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ СИМПТОМЫ:

- а) скудный стул с обилием густой, мутной слизи, прожилками крови; схваткообразные боли в левой подвздошной области
- б) жидкий стул без болей в животе
- в) жидкий стул, боли в правой подвздошной области
- г) жидкий стул, боли в желудке

13. УКАЖИТЕ, КАКИЕ ВАРИАНТЫ ПРОДРОМАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ ОСТРОМ ГЕПАТИТЕ В:

- а) смешанный
- б) диспепсический
- в) артралгический
- г) астено-вегетативный
- д) кожный
- е) всё вышеперечисленное

Рубежный контроль успеваемости-РКУ (Итоговое занятие)
Тесты 2 Вариант

1. Укажите причину кишечного кровотечения при брюшном тифе у детей:
а) интоксикация
б) бактериемия
в) язвенное поражение лимфоидных образований подвздошной кишки
г) язвенное поражение двенадцатиперстной кишки
2. Цитолиз печеночных клеток при вирусных гепатитах отражают следующие биохимические тесты:
а) уровень холестерина
б) уровень общего белка и белковые фракции крови
в) уровень аланинаминотрансферазы и аспаргинаминотрансферазы
г) тимоловая проба
3. Какие ферменты отражают холестаза при вирусных гепатитах у подростков?
а) АлАт
б) АсАт
в) цАМФ
г) ЩФ
4. Какое звено патогенеза определяет тяжесть течения холеры?
а) интоксикация
б) изотоническая дегидратация
в) инвазия возбудителя в слизистую оболочку кишечника
г) генерализация инфекционного процесса
5. Какие серологические маркеры характерны для гепатита А в остром периоде болезни?
а) HBsAg
б) anti-Hbcor IgM
в) anti-HAV IgM
г) anti-HCV IgM
6. Какой из серологических маркеров не характерен для острого гепатита В у детей?
а) HBsAg
б) anti-Hbcor IgM
в) anti-HAV IgM
г) anti-Hbe IgM
7. Сочетание каких симптомов характерно для острой формы амебиаза?
а) боли в правой подвздошной области, жидкий стул
б) боли в правой подвздошной области, стул по типу «малинового желе»
в) рвота, отсутствие болей в животе
г) высокая температура, жидкий с прожилками крови стул
8. Какой симптом не характерен для лептоспироза?
а) интоксикация
б) интенсивные миалгии
в) поражение почек
г) обильный частый водянистый стул

9.Какой стартовый инфузионный раствор следует назначить при эксикозе 2-й степени?

- а) плазма
- б) кровь
- в) глюкозо-солевой раствор
- г) физиологический раствор

10.Какая лечебная тактика неправомерна при начальных проявлениях дифтерийного крупа?

- а) введение анальгетиков
- б) введение противодифтерийной сыворотки
- в) инфузия эуфиллина внутривенно
- г) трахеотомия
- д) применения антигистаминных средств

11.Какие гематологические данные характерны для коклюша?

- а) лейкоцитоз
- б) тромбоцитопения
- в) лимфоцитоз
- г) анемия
- д) ускорение СОЭ

12.Раннее осложнение скарлатины:

- а) полиартрит
- б) гнойный лимфаденит
- в) менингит
- г) конъюнктивит
- д) аппендицит

13.Какие симптомы характерны для ветряной оспы?

- а)длительная фебрильная лихорадка
- б)водянистая диарея
- в) полиморфизм сыпи
- г) геморрагический синдром
- д) мелкоточечная сыпь

14.Какие осложнения не характерны для кори?

- а)пневмонии
- б)стоматиты
- в)полиартриты
- г)энцефалиты
- д)ларингиты

15.Какие проявления не характерны для паротитной инфекции?

- 1)поражение слюнных желез
- а) поражение яичек
- б) поражение поджелудочной железы
- в) поражение мозговых оболочек
- г) поражение легких

Рубежный контроль успеваемости – РКУ (Итоговое занятие)

Тесты 3 вариант

1. Какой препарат противопоказан при инфекционном мононуклеозе из-за частых аллергических реакций?
 - а. анальгин
 - б. парацетамол
 - в. ампициллин
 - г. эритромицин
 - д. интерферон

2. Что из перечисленных ниже мероприятий наименее правильно при остром стенозирующем ларинготрахеите?
 - а. Седативные средства
 - б. Обильное питьё
 - в. Паровые щелочные ингаляции
 - г. Муколитические средства
 - д. Эуфиллин

3. Какой симптом не характерен для брюшного тифа?
 - а. Адинамия
 - б. Дикротия пульса
 - в. Эйфория
 - г. Розеолёзная сыпь
 - д. Гепатоспленомегалия

4. Укажите симптом, не являющийся признаком декомпенсированного обезвоживания:
 - а. Гипотермия
 - б. Генерализованные судороги
 - в. Гипертермия
 - г. Анурия
 - д. Отсутствие периферического пульса

5. Сочетание каких симптомов характерно для ботулизма?
 - а. Высокая температура, частый стул
 - б. Высокая температура, нарушение сознания
 - в. Нарушение зрения, глотания
 - г. Судороги мышц, жидкий стул

6. Какой симптом не характерен для острой печёночной недостаточности?
 - а. Увеличение размеров печени
 - б. Тахикардия
 - в. Сокращение размеров печени
 - г. Энцефалопатия
 - д. Геморрагии

7. Какой из антибактериальных препаратов не назначают для лечения генерализованной формы сальмонеллёза?
 - а. Фуразолидон
 - б. Ампициллин
 - в. Левомецетин
 - г. ципрофлоксацин

8. Какой процент потери массы тела при алгидной форме холеры?

- а. 0,03
- б. 0,06
- в. 0,09
- г. 10% и выше

9. Укажите характерные изменения в первичной крови при брюшном тифе:

- а. Нейтрофильный лейкоцитоз
- б. Лейкопения с относительным лимфоцитозом

- а. Нейтрофильный
- б. Лимфоцитарный
- в. Нормальный

1. Для подтверждения диагноза менингококкового менингита у детей используют метод:

- а. Определения цитогаммы ликвора, определение уровня глюкозы, выделение культуры
- б. Определение цитогаммы ликвора, прямую бактериоскопию мазков ликвора

2. У детей грудного возраста, больных менингококковым менингитом, отмечают:

- а. Желтуха
- б. Атрофия зрительных нервов
- в. Гипертензия
- г. Симптом Труссо
- д. Выбухание и напряжение большого родничка
- е. Обезвоживание

3. Причиной летального исхода при менингококцемии у детей может быть:

- а. Отит
- б. Стеноз гортани
- в. Инфекционно-токсический шок

4. Главным клиническим симптомом менингококкового менингита у детей являются:

- а. Внезапное начало болезни + менингеальные симптомы
- б. Жидкий стул + сильная головная боль
- в. Лихорадка+ гипотензия
- г. Парез конечностей + судороги

5. Поражение слюнных желёз при эпидемическом паротите у детей характеризуется:

- а. Увеличением размеров и болезненность железы
- б. Фиброзированием
- в. Гиперемией кожи
- г. Абсцедированием слюнных желёз

6. Для менингита паротитной этиологии у подростка характерны:

- а. Менингеальные знаки + сиалоаденит
- б. Повторная рвота + судороги
- в. Головная боль + сыпь
- г. Геморрагическая сыпь+ парез

7. Для орхита паротитной этиологии у подростка характерны:

- а. Увеличение размеров и болезненность яичка

б. Фиброзирование яичка

в. Атрофия мошонки

г. Иррадиация болей в паховую область на стороне поражения яичка

д. Флегмона паховой области

е. Острая задержка мочеиспускания

8. Вакцинация против эпидемического паротита у детей проводится:

а. Живой моновакциной

б. Полисахаридной вакциной

в. Ассоциированной с противодифтерийной и противостолбнячной вакцинами

9. Возбудителями инфекционного мононуклеоза у детей являются вирусы семейства

а. Верно

б. Неверно

10. При инфекционном мононуклеозе у детей в периферической крови выявляются:

а. Нейтрофилёз + лимфопения

б. Лимфопения + нейтропения

в. Атипичные мононуклеары + лимфоцитоз

г. Лимфоцитоз + эозинофилия

11. При инфекционном мононуклеозе у детей для лечения ангины ампициллин:

а. Не используют

б. используют

1. Типичными поражениями инфекционного мононуклеоза у детей являются:

а. Неврит

б. Мезаденит

в. Увеличение шейных лимфоузлов

г. Кардит

д. Орхит

2. Определяющим диагностическим лабораторным тестом EBV-инфекционного мононуклеоза является:

а. Обнаружение моноцитов

б. Обнаружение антител к вирусу Эпштейна-Барр

в. Изменение содержания мочевины

г. Реакция гемагглютинации

3. Вирус иммунодефицита человека отнесён к семейству:

а. Ретровирусов

б. Пикорнавирусов

в. Миксовирусов

г. Реовирусов

4. При ВИЧ-инфекции у детей в стадии 4а, 4в (стадии СПИДа), 5(терминальная) в пер

а. Лейкоцитоз + лимфоцитоз

б. Лимфоцитоз + лейкопения

в. Лейкопения + лимфопения

5. При ВИЧ-инфекции у детей на ранних стадиях болезни показатели сывороточных
- Низкие
 - Нормальные
 - Повышенные
6. Определение специфических антител anti-GP 120, anti-gr 41 у ВИЧ инфицированных
- 3 дня
 - 5 дней
 - 21-30 дней
7. Начальные симптомы ВИЧ-инфекции у детей:
- Синдром приобретённого иммунодефицита
 - Флегмоны
 - Кахексия
 - Лимфаденопатия
 - Параличи
 - Абсцессы печени
8. Для экспресс-диагностики гриппа у детей применяется реакция:
- Связывания комплимента
 - Торможение гемагглютинации
 - Иммунофлюоресценции, иммунохроматографии
9. Степень стеноза гортани у детей определяет:
- Наличие в лёгких влажных хрипов
 - Степень дыхательной недостаточности
10. Основные симптомы гриппа у детей:
- Головная боль в области лба и висков, боль в глазных яблоках, высокая температура
 - Увеличение печени, селезёнки, лимфоузлов
 - Кашель, менинго-энцефалит, парез нёбной занавески
 - Лимфаденопатия, мезаденит, плеврит
11. Для крупа (острого стенозирующего ларингита) у детей характерны:
- Грубый лающий кашель, осиплый голос, инспираторная одышка
 - Экспираторная одышка, гиперкинезы, диарея
 - Одышка, цианоз, гепатомегалия
 - Шумное дыхание, тахикардия, асцит
12. Симптомами аденовирусной инфекции у детей являются:
- Гранулёзный тонзиллофарингит, плёнчатый конъюнктивит, лимфаденопатия
 - Боли в суставах, плеврит, менингит

Рубежный контроль успеваемости - РКУ (Итоговое занятие)
Тесты 4 Вариант

1. КАКИЕ СИМПТОМЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЭКХИОЗА 1-Й СТЕПЕНИ?
а) олигурия
б) жажда, сухость слизистых
в) адинамия
г) гемодинамические расстройства
д) судороги
2. КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ НЕ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТОКСИЧЕСКОЙ ДЕФТЕРИИ?
а) миокардит
б) полирадикулоневрит
в) гломерулонефрит
г) инфекционнотоксический шок
д) геморрагический синдром
3. ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ КОКЛЮША У ГРУДНОГО РЕБЕНКА В ТЕРАПИЮ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ:
а) оксациллин
б) гидрокортизон
в) отхаркивающую микстуру
г) ЛФК
д) пребывание на свежем воздухе
4. ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СКАРЛАТИНЫ СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ:
а) через год
б) через 5 месяцев
в) через 3 недели
г) через 3 года
д) через 6 недель
5. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЕТРЯННОЙ ОСПЫ:
а) нарастание титра противовирусных антител в парных сыворотках
б) клинические проявления заболевания
в) посевы кала и мочи с целью выделения возбудителя
г) исследование бактериологического обсеменения слизи, взятой из глотки
д) люмбальная пункция (состав ликвора)
6. С КАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ КОРЬ?
а) с полиомиелитом
б) с краснухой
в) с сальмонеллезом
г) с дифтерией
д) с мононуклеозом
7. КАКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ?
а) интраназальное введение интерферона
б) наложение карантина
в) изоляция заболевших
г) активная вакцинация
д) введение иммуноглобулина внутримышечно

8. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛОЗЕ?

- а) нейтропения
- б) нейтрофилез
- в) моноцитопения
- г) появление атипичных мононуклеаров
- д) лимфопения

9. КАКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ НЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ДЕКАМПЕНСИРОВАННОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПРИ ХОЛЕРЕ?

- 1) увеличение ОЦК;
- 2) ацидоз;
- 3) гипокалиемию;
- 4) гипохлоремия.

10. КАКОЙ СИМПТОМ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ТРИХИНЕЛЛЕЗА?

- а) кашель
- б) лихорадка
- в) отек лица
- г) миалгии

11. УКАЖИТЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ДИАРЕИ ПРИ ХОЛЕРЕ:

- а) проникновение вибриона в энтероциты
- б) слущивание эпителия тонкой кишки
- в) поражение вегетативной иннервации тонкой кишки
- г) воздействие токсических субстанций на ферментативные системы энтероцитов

12. УКАЖИТЕ ПЕРВИЧНУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В КИШЕЧНИКЕ ПРИ АМЕБИАЗЕ:

- а) прямая кишка
- б) сигмовидная кишка
- в) двенадцатиперстная кишка
- г) слепая и восходящий отдел толстой кишки

13. УКАЖИТЕ ХАРАКТЕР СТУЛА ПРИ КОЛИТИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ДИЗЕНТЕРИИ:

- а) обильный водянистый
- б) обильный типа «мясных помоев»
- в) типа «малинового желе»
- г) скудный со слизью и прожилками крови

14. УКАЖИТЕ, КАКИЕ ОТДЕЛЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ БОТУЛИЗМЕ:

- а) кора головного мозга
- б) двигательные ядра продолговатого мозга
- в) периферические нервы
- г) ганглии

15. ВЫБИРИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У РЕБЕНКА:

- а) цефтриаксон
- б) сальмонеллезный бактериофаг
- в) тиенам
- г) линезолид
- д) бифиформ «Малыш»

Рубежный контроль успеваемости-РКУ (Итоговое занятие)
Тесты 5 Вариант

1. КАКУЮ ДОЗУ ПРОТИВОДИФТЕРИЙНОЙ СЫВОРОТКИ СЛЕДУЕТ ВВЕСТИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ I-II СТЕПЕНИ ОДНОМОМЕНТНО?

- а) 10-15 тыс. ЕД
- б) 40 тыс. ЕД
- в) 30 тыс. ЕД
- г) 300 тыс. ЕД
- д) 70 тыс. ЕД

2. КАКИЕ МЕРЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ У РЕБЕНКА 1-ГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ СТАРШЕГО БРАТА КОКЛЮШЕМ?

- а) назначить пенициллин
- б) срочно вакцинировать
- в) изолировать
- г) ввести противокклюшевый иммуноглобулин
- д) интраназально закапать интерферон

3. ВЫБЕРИТЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ АНТИБИОТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ:

- а) Полимиксин
- б) Пенициллин
- в) Амфотерицин В
- г) Ципробай
- д) Лангоцеф

4. ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ:

- а) антибиотики
- б) бактериофаги
- в) препараты Ацикловира и его аналогов
- г) раствор бриллиантовой зелени
- д) антигистаминная терапия

5. ДЛЯ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КОРИ ХАРАКТЕРНО:

- а) диспепсические явления
- б) положительный симптом Пастернацкого
- в) менингеальный симптомокомплекс
- г) пятна Бельского-Филатова-Коплика на слизистой полости рта
- д) фолликулярная ангина

6. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА

- а) контактный
- б) воздушно-капельный
- в) водный
- г) пищевой
- д) фекально-оральный

7. КАКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕ СОПРОВОЖДАЮТСЯ НАЛОЖЕНИЯМИ НА МИНДАЛИНАХ?

- а) инфекционный мононуклеоз
- б) ветряная оспа
- в) дифтерия
- г) скарлатина

д) лакунарная ангина

8. У РЕБЕНКА 2-Х ЛЕТ С ОРВИ НОЧЬЮ ПОЯВИЛСЯ ЛАЮЩИЙ КАШЕЛЬ, ОХРИПЛОСТЬ, ОДЫШКА С УДЛИНЕННЫМ ВДОХОМ, КАКОЙ ДИАГНОЗ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТЕН?

- а) острая пневмония
- б) острый бронхит
- в) бронхиальная астма
- г) острый стенозирующий ларинготрахеит
- д) острый тонзиллит

9. ДЛЯ ХОЛЕРЫ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ СИМПТОМОВ:

- а) обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе, тошноты
- б) тошнота, рвота
- в) водянистый зловонный стул
- г) жидкий зеленоватой окраски стул, диффузные боли в животе

10. ГЕНЕРАЛИЗОВАННУЮ ФОРМУ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ОТ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ОТЛИЧАЮТ СИМПТОМЫ:

- а) рвота
- б) боли в животе
- в) жидкий стул
- г) гепатоспленомегалия

11. КАКАЯ ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ У ДЕТЕЙ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ?

- а) дизентерия
- б) ротавирусная инфекция
- в) сальмонеллез
- г) стафилококковый энтероколит
- д) кампилобактериоз

12. ДЛЯ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ ДИФТЕРИИ НЕ ХАРАКТЕРНЫ:

- а) умеренная болезненность при глотании
- б) тризм жевательной мускулатуры
- в) температура тела 38,0 °C
- г) застойная гиперемия зева

13. ДЛЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ ИЕРСИНИОЗА ХАРАКТЕРНЫ СИМПТОМЫ:

- а) жидкий стул, боли в левой подвздошной области
- б) жидкий стул, без болей в животе
- в) жидкий стул, боли в правой подвздошной области
- г) жидкий стул, боли в желудке

14. УКАЖИТЕ КАКИЕ ВАРИАНТЫ ПРОДРОМАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ ГЕПАТИТЕ В:

- а) смешанный
- б) диспепсический
- в) артралгический
- г) астено-вегетативный

15. УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ

- а) интоксикация
- б) бактериемия
- в) язвенное поражение лимфоидных образований подвздошной кишки
- г) язвенное поражение двенадцатиперстной кишки