

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
(для выписывания в рецептах на итоговых занятиях и на экзамене)
для студентов стоматологического факультета

№ п/п	Название	Формы выпуска	Показание к применению (пример)	Способ применения (пример)
1.	Прокаин (Procainum) Новокаин (Novocaine)	порошок	местная анестезия	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ров для внутреннего применения
		р-р 0,25%; 0,5% – 100; 200; 400 мл – фл. р-р 0,25%; 0,5% – 1; 2; 5; 10; 20 мл – амп.		инфильтрационная анестезия
		р-р 1%; 2% – 1; 2; 5; 10 мл амп.		проводниковая и перидуральная анестезия
2.	Артикаин (Articainum)	р-р 1%; 2%; – 1; 2; 5; 10; 20 мл – амп.	местная анестезия	инфильтрационная анестезия
		р-р 4% – 1; 2 мл – амп.		проводниковая анестезия
3.	Лидокаин (Lidocainum)	порошок	местная анестезия	в составе магистральных прописей
		аэрозоль дозированный 10% – 50 мл (650 доз)		на кожу и слизистые оболочки (терминальная анестезия)
		р-р 1% – 10; 20 мл амп. р-р 2% – 2; 10 мл амп.		для всех видов местной анестезии
		р-р 10% – 2 мл амп.	желудочковая аритмия	в/м; в/в капельно после разведения до 100-400 мл
4.	Отвар коры дуба (Decoctum corticis Quercus)	отвар 1:10 – 1:15	стоматит	полоскать рот 6-8 раз в сутки; перед употреблением взбалтывать.
5.	Атропина сульфат (Atropini sulfas)	1% р-р 5 мл глазные капли	обследование глазного дна	применяют местно по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок до 3 раз в день с интервалом 5-6 ч.
		р-р 0,05%; 0,1% – 1 мл амп.	премедикация наркоза	в/в; в/м; п/к по 0,25-1 мл
			отравление М,Н-холиномиметиками	
6.	Эпинефрин (Epinеphrinum) Адреналин (Adrenaline)	порошок	открыто-угольная глаукома	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ра 1%; 2% для наружного применения (в глаз) и р-ров местных анестетиков
		р-р 0,1% – 1 мл амп.	анафилактический шок	п/к, редко в/м или в/в 0,2-0,75 мл
			асистолия	внутрисердечно 1 мл
7.	Салбутамол (Salbutamolum)	аэрозоль дозированный 0,2% 12 мл (200 доз по 0,0001);	бронхиальная астма	ингаляционно по 1 дозе при приступе удушья, но не чаще 4-х раз в сутки
		0,1% р-р по 2,5; 5; 10 мл для ингаляций		ингаляционно по 2 мл через небулайзер до 4 раз в день

8.	Фенилэфрин (Phenylephrinum) Мезатон (Mesaton)	0,125% р-р по 5,10,15 мл	острый ринит	по 3-4 капли в нос, не чаще чем каждые 6 часов
		2,5%, 10% р-р по 5 мл	иридоциклит	по 1 капле в глаза 2-3 раза в день
		р-р 1% – 1 мл амп.	острая гипотензия	п/к, в/м по 0,5-1 мл в/в по 0,1-0,5 мл
9.	Бисопролол (Bisoprololum)	таб., покрытые оболочкой, 0,0025; 0,005; 0,01	артериальная гипертония	внутри по 0,00125-0,01 1 раз в сутки утром
10.	Этанол (Ethanol) Спирт этиловый (Spiritus aethylicus)	р-р 40%	согревающий компресс	наружно и для приготовления лекарственных форм
		р-р 70%	обработка рук хирурга	
		р-р 95% (чистое вещество, в рецепте термин «раствор» не пишется, но концентрация 95% указывается)	обработка мед. инструментов	
11.	Диазепам (Diazepamum) Сибазон (Sibazon) Седуксен (Seduxen) Реланиум (Relanium)	порошок; таб. 0,005	невроз	внутри по 0,005-0,01 в сутки, в 2-4 приема
		р-р 0,5% – 2 мл амп.	купирование судорог	в/в; в/м по 2-4 мл
		Микроклизма 0,2% ректальный р-р -1,25 мл; 2,5мл; 0,4%-2,5мл и 5 мл	купирование судорог	ректально по 1 микроклизме
12.	Морфин (Morphinum) Морфина гидрохлорид (Morphini hydrochloridum)	таб. покрытые оболочкой 0,005; 0,01	травматическая боль	внутри по 0,005; 0,01 каждые 4 часа
		р-р 1% – 1 мл амп.	послеоперационная боль	п/к, в/м по 1-3 мл с интервалом не менее 4 часов
13.	Тримеперидин (Trimeperidinum) Промедол (Promedolum)	порошок, таб. 0,025	боли, связанные с ожогом	внутри по 0,025-0,05 4-6 раз в сутки
		р-р 1%; 2% – 1 мл амп.	почечная колика	п/к, в/м, в/в с интервалом не менее 4 часов по 0,01-0,04
14.	Кислота ацетилсалициловая (Acidum acetylsalicylicum)	порошок; таб. 0,25; 0,5	боль, связанная с воспалительным процессом	внутри после приема пищи, тщательно измельчив, после 14 лет по 0,25 2 раза в сутки; после 18 лет по 0,25-1,0 3-6 раз в сутки
15.	Ибупрофен (Ibuprofenum) «Нурофен» («Nurofen») «Нурофен» для детей («Nurofen» for Children)	таб., покрытые оболочкой, 0,2	лихорадка при вирусном заболевании	внутри по 0,2 3-4 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов
		суспензия для внутреннего применения 2% - 100; 150; 200 мл		внутри после встряхивания флакона по 1-2 дозировочным шприцам (5мл) не чаще 3-х раз в сутки
		свечи ректальные 0,06		ректально по 0,06 не чаще 3-4 раз в сутки

16.	Мелоксикам (Meloxicamum) «Мовалис» («Movalis»)	таб.0,0075; 0,015; суспензия для внутреннего применения 0,15% – 100 мл свечи ректальные 0,0075; 0,015	артрит	внутри (ректально) по 0,0075-0,015 1 раз в сутки
		р-р 1% – 1,5 мл амп.		в/м по 0,5-1мл 1 раз в сутки не более 3-х дней
17.	Хлорпромазин (Chlorpromazinum) Аминазин (Aminazine)	драже 0,025; 0,05; 0,1; таблетки, покрытые оболочкой, 0,025; 0,05; 0,1	психоз	внутри по 0,025-0,075 1-4 раза в сутки
		р-р 2,5% – 1; 2; 5; 10 мл амп.		в/м, в/в 1-6 раз в сутки от 1 до 5 лет по 0,0005 на 1 кг массы тела; от 5 до 20 лет – по 0,5-2,5 мл; старше 20 лет – по 1-5 мл
18.	Экстракт валерианы густой (Extractum Valerianae spissum)	таб., покрытые оболочкой, 0,02	расстройство сна, связанное с перевозбуж- дением	внутри по 0,02-0,04 за 30-60 минут до сна
19.	Инсулин растворимый человеческий генно- инженерный (Insulinum solubile humanum biosyntheticum) «Актрапид НМ» («Actrapid НМ»)	р-р (1 мл – 100 МЕ) – 10 мл	сахарный диабет	п/к, в/м по 0,1 – 0,3 МЕ/кг за 30 минут до еды 4 раза в сутки
			диабетическая кома	в/в 0,1 МЕ/кг массы тела каждые 30 минут под контролем кетоацидоза
20.	Преднизолон (Prednisolonum)	таб.0,001; 0,005	ревматоидный артрит	внутри по 0,001-0,01 2-4 раза в сутки, максимальная доза – утром
		суспензия 2,5% – 1 мл амп.		в/м по 1-2 мл 2-4 раза в сутки
		р-р 1,5% – 2 мл; 3% – 1; 2 мл амп.	анафилакти- ческий шок	в/м по 1-2 мл 2-4 раза в сутки
		мазь 0,5% – 5,0; 10,0; 20,0		псориаз
		мазь глазная 0,5% – 5,0	иридоциклит	в нижний конъюнктивальный мешок по 1-2 см 2-3 раза в сутки

21.	Эргокальциферол (Ergocalciferolum)	драже 500 МЕ, р-р масляный 500; 1 000 МЕ капс., р-р масляный 0,0625%; 0,125%; 0,5% [1 мл – 25 000; 50 000; 200 000 МЕ соответственно] (внутрь), р-р спиртовой 0,5% [1 мл – 200 000 МЕ] (внутрь)		
22.	Аминофиллин (Aminophyllinum) Эуфиллин (Euphyllin)	порошок, таб.0,15, р-р 24% – 1 мл амп. р-р 2,4% – 10 мл амп.	бронхиальная астма	внутрь по 0,15 1-3 раза в сутки в/м глубоко в верхний наружный квадрант ягодицы по 1 мл 1-3 раза в сутки в/в медленно 2-3 раза в сутки от 4 до 7 лет – по 0,06-0,12; от 8 до 18 лет 0,12-,24 в сутки
23.	Хлоропирамин (Chloropyrami- num) «Супрастин» («Suprastin»)	таб.0,025 р-р 2% – 1 мл амп.	поллиноз ангионевро- тический отек	внутрь 3-4 раза в сутки от 1 месяца до 1 года – 0,005; от 1 до 6 лет – 0,01; от 7 до 18 лет – по 0,02; старше 18 лет – по 0,025 в/м; в/в по 0,5-1 мл 1-2 раза в сутки
24.	Метоклопрамид (Metocloprami- dum) «Церукал» («Cerucal»)	таб.0,01 р-р 0,5% – 2 мл амп.	тошнота рвота	внутрь за 30 минут до еды 2-3 раза в сутки не дольше 5 суток от 2 до 3 лет - (10-14 кг) – по 0,001; от 3 до 5 лет (15- 19 кг) – по 0,002; от 5 до 9 лет (20- 29 кг) – по 0,0025; от 9 до 18 лет (30- 60 кг) – по 0,005; после 15 лет (более 60 кг) – 0,01 в/м; в/в по 2 мл 2-3 раза в сутки
25.	Омепразол (Omeprazolom)	капс.0,01; 0,02; 0,04	язвенная болезнь двенадцати- перстной кишки	внутрь по 0,01-0,04 1 раз в сутки в течение 7 дней
26.	Верапамил (Verapamilum)	таб., покрытые оболочкой, 0,04; 0,08; драже 0,04; 0,08 р-р 0,25% – 2 мл амп.	предсердная тахикардия	внутрь по 0,04-0,08 3-4 раза в сутки в/в медленно (не быстрее 1 мл/мин) под контролем ЭКГ по 2-4 мл
27.	Амлодипин (Amlodipinum)	таб.0,0025; 0,005; 0,01	артериальная гипертония	внутрь по 0,0025-0,01 1 раз в сутки
28.	Эналаприл (Enalaprilum)	таб.0,005; 0,01; 0,02	артериальная гипертония	внутрь по 0,0025-0,002 1-2 раза в сутки
29.	Лозартан (Losartan)	таб.0,05; 0,1		
30.	Гидрохлоро- тиазид (Hydrochloro- thiazidum)	таб.0,025; 0,1	артериальная гипертония	внутрь до 14 лет 2-3 раза в сутки в суточной дозе 0,001/кг; после 14 лет 1 раз в сутки утром или 1 раз в 2 дня по 0,025-0,1

	Гипотиазид (Hypothiazid)			
31.	Фуросемид (Furosemidum) «Лазикс» («Lasix»)	порошок; таб.0,04	хроническая сердечная недоста- точность	внутри по 0,02-0,04 1 раз в сутки утром
		р-р 1% – 2 мл амп.	гиперто- нический криз	в/м; в/в (не быстрее, чем 0,004 в минуту) по 0,02-0,04 1-2 раза в сутки
32.	Нитроглицерин (Nitroglycerinum)	таб.0,0005; р-р масляный 1% – 0,05 мл капс.	купирование приступа стенокардии	под язык по 0,0005 при боли в сердце
		аэрозоль дозиро- ванный 0,8% – 10 мл (200 доз по 0,0004)		под язык по 1-2 дозы при боли в сердце
		р-р 0,1% – 2; 5; 10 мл амп.; 50; 100; 500 мл – фл.	кардиогенный отёк лёгких	в/в через автоматический дозатор 24-240 мл/сутки
33.	Клопидогрел (Clopidogrelum) «Плавикс» («Plavix»)	таб., покрытые оболочкой, 0,075; 0,3	профилактика тромбо- образования при остром инфаркте миокарда	внутри по 0,075 1 раз в сутки при генетически низкой активности изофермента CYP2C19 доза увеличивается до 0,15-0,6 1 раз в сутки
34.	Гепарин натрия (Heparinum natrium) Гепарин (Heparin)	5000 МЕ/мл – 1; 2; 5 мл амп., 1; 5; 10 мл – фл.	профилактика тромбо- образования при остром инфаркте миокарда	в/в по 5000-10000 МЕ (100-150 МЕ/кг) каждые 4-6 часов; п/к в белую линию живота по 8000-10000 МЕ каждые 8 часов
		мазь 1000 ЕД/г –15,0; 20,0; 30,0; 50,0; 100,0	поверхностный тромбофлебит	на кожу над пораженной областью 2-3 раза в сутки
35.	Ривароксабан (Rivaroxabanum) «Ксарелто» («Xarelto»)	таб., покрытые оболочкой, 0,0025; 0,01; 0,015; 0,02	предопера- ционная про- филактика тромбоэмбо- лии	внутри по 0,0025-0,02 1 раз в сутки
36.	Варфарин (Warfarinum)	таб.0,0025	вторичная профилактика инфаркта миокарда	внутри сначала по 0,0002/кг в сутки, затем индивидуально под контролем протромбинового индекса
37.	Менадион натрия бисульфит (Menadioni natrii bisulfitis) Викасол (Vicasol)	порошок, таб.0,015,	гипопро- тромбинемия, обусловленная дефицитом витамина К	внутри по 0,015 1-2 раза в сутки
		р-р 1% – 1; 2 мл амп.		в/м по 1-1,5 мл 1-2 раза в сутки
38.	Железа (III) гидроксид полимальтозат (Ferri (III) hydroxydum polymaltosatum)	таб.0,1	железо- дефицитная анемия	внутри после 12 лет по 0,1 1-3 раза в сутки до нормализации гемоглобина и еще 1-2 месяца после
		р-р 5% – 10 мл; 30 мл		внутри по 20-60 капель в сутки до нормализации гемоглобина и еще 1-2 месяца после

	«Мальтофер» («Maltofer»)	сироп 1% – 150 мл р-р 5% – 2мл амп.		внутри от 1 до 15 лет – по 0,5-1 чайной ложке в сутки до нормализации гемоглобина и еще 1-2 месяца после в/м на глубину не менее 5-6 см 1 раз в сутки. Детям разовая и курсовая дозы рассчитываются индивидуально исходя из показателей возраста, массы тела, показателей и динамики гемоглобина крови. После 18 лет – по 2мл
39.	Кальция глицерофосфат (Calcii glycerophosphas)	таб.0,2	гипокальци- емия	внутри по 0,2-0,5 2-3 раза в сутки детям с 2 лет по 0,05-0,2 2-3 раза в сутки
40.	Облепиховое масло (Oleum Hippophaë)	50; 100мл	гингивит	на поражённые участки слизистой оболочки ротовой полости 4-6 раз в сутки
41.	Натрия фторид (Natrii fluoridum)	таб. 0,0022	профилактика кариеса при недостатке фтора в питьевой воде	детям после 6 лет – внутри по 1 таб. 1 раз в сутки
42.	Мирамистин (Miramistinum) Бензилдиметил- миристоиламино- пропиламмоний	р-р 0,01% – 50; 100; 150; 200 мл	стоматит	полоскать рот 3-4 раза в сутки
		мазь 0,5%		наносить на поражённые участки слизистой оболочки 3-4 раза в сутки
43.	Хлоргексидин (Chlorhexidinum)	р-р 0,05%; 0,2%	антибактери- альная обра- ботка слизис- тых оболочек ротовой полости	полоскать рот 2 раза в сутки
		р-р 0,5%; 1% аэрозоль 0,5% – 70; 100 мл	обработка раневой поверхности	на поражённые участки кожи 2 раза в сутки
		р-р 5%		в составе магистральных прописей
		свечи вагинальные по 0,008; 0,016	профилактика заболеваний, передающихся половым путем	по 1 свече во влагалище не позднее 2ч после полового акта
44.	Сульфацил- натрий (Sulfacylum- natrium) Альбуцид	порошок	пневмония	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ра для в/в (медленно!) инъекций 30%
		р-р 10%; 20%; 30% – 5; 10 мл	бактериальный конъюнктивит	в поражённый глаз по 1-2 капли 3-5 раз в сутки
45.	Метронидазол (Metronidazolium)	таб. по 0,25	эрадикация Helicobacter pylori	внутри по 0,25-0,5 2-3 раза в сутки

	«Трихопол» («Trichopol»)	свечи вагинальные по 0,5	трихомо- надный вагинит	вагинально по 1 свече 2 раза в сутки
		р-р для инфузий 5% – 100 мл	внекишечный амебиаз	внутривенно капельно со скоростью не более 5 мл/мин по 100 мл через каждые 8 часов
46.	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacinum) «Цифран» («Cifran»)	р-р 0,3% – 5; 10 мл	конъюнктивит	по 1-2 капли в пораженный глаз каждые 4 часа
		таб., покрытые оболочкой, 0,25; 0,5; 0,75	пиелонефрит	внутри по 0,125-0,5 2 раза в сутки в течение 7-10 суток
		р-р 0,2% – 100 мл		в/в капельно по 50-100 мл 2 раза в сутки
47.	Амоксициллин и клавулановая кислота (Amoxicillinum et Acidum clavulanicum) «Амоксиклав» («Amoksiklav»)	таб. (содержат 0,25; 0,5 или 0,875 амоксициллина тригидрата и 0,125 калиевой соли клавулановой кислоты) N.10	острый тонзиллит	внутри не разжевывая по 0,25-0,5 3 раза в сутки
		порошок (содержит 2,5 амоксициллина тригидрата и 0,625 калиевой соли клавулановой кислоты)		энергично встряхнуть флакон, добавить воды до 100 мл (до метки) в два приема, каждый раз хорошо встряхивая до полного растворения порошка. Принимать внутри после встряхивания по 1 мерной ложке (5мл) через каждые 12 часов.
48.	Азитромицин (Azithromycin)	таб.0,5, капс.0,125; 0,25	пневмония	внутри 1 раз в сутки 0,5 в первые сутки лечения и по 0,25 каждые последующие 4 дня
49.	Гентамицин (Gentamicinum)	0,08 фл.	острый пиелонефрит	в/м, в/в недоношенным и новорожденным 1-2,5 мг/кг 2 раза в сутки; после 1 месяца по 0,7-1,7 мг/кг 3 раза в сутки
		р-р 4% – 2 мл амп.		в/м, в/в по 2 мл 2-3 раза в сутки
		мазь 0,1% 10,0	инфекционный дерматит	на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки
50.	Ацикловир (Acyclovirum) «Зовиракс» («Zovirax»)	таб.0,2; 0,4; 0,8	герпетическая инфекция	внутри по 0,2 5 раз в сутки
		мазь 5% – 2,0; 5,0; 10,0; 15,0		на пораженные участки кожи и слизистых оболочек 4-6 раз в сутки
		мазь 3% – 3,0; 5,0		в нижний конъюнктивальный мешок по 1 см 5 раз в сутки
		0,25; 0,5; 1,0 фл.		в/в капельно после растворения содержимого флакона в 50-100 мл стерильного 0,9%-ного р-ра хлорида натрия через каждые 8 часов
51.	Нистатин	таб., покрытые оболочкой по 250000 ЕД; 500000 ЕД	кандидоз	внутри по 500000 ЕД 4-8 раз в сутки
		свечи вагинальные 500000 ЕД		по 1 свече 2 раза в сутки

52.	Флуконазол (Fluconazolium)	порошок; капс.0,05; 0,1; 0,15; таблетки, покрытые оболочкой, 0,05; 0,1; 0,15	профилактика грибковых инфекций при лечении цитостатиками	внутри по 0,05-0,15 1 раз в сутки
		р-р 0,2% – 50; 100мл фл.	криптококкоз	в/в капельно со скоростью 2 мл/минуту по 50-100 мл 1 раз в сутки

Список сокращений: р-р - раствор; амп. – ампулы; фл. – флаконы; таб. – таблетки; капс. – капсулы; в/м – внутримышечно; в/в – внутривенно; п/к – подкожно; /кг – на 1 кг массы тела.

ВРД – высшая разовая доза / максимальная рекомендуемая разовая доза; ВСД – высшая суточная доза / максимальная рекомендуемая суточная доза; ВКД – высшая курсовая доза / максимальная рекомендуемая курсовая доза.

* Кодеин обычно назначается в составе комбинированных препаратов «Терпинкод Н» («Terpinocodum N») – кодеин + терпингидрат, «Седал-М» («Sedal-M») – кодеин + кофеин + метамизол натрия + парацетамол + фенобарбитал и др.

Международное непатентованное название выделено **полужирным шрифтом**. В кавычках « » указаны коммерческие названия, защищенные патентами.