

Тестовые задания к экзамену по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского образования в российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также лиц с высшим медицинским образованием, полученным в российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским образованием

Выберите один правильный ответ

1. Как часто следует проводить смену постельного и нательного белья:

- а) 1 раз в 10 дней
- б) 1 раз в 14 дней
- в) 1 раз в 7 дней
- г) 1 раз в 3 недели
- д) по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней

2. Какой способ введения лекарственных препаратов называется парентеральным:

- а) применение лекарственных средств с помощью инъекций
- б) любой способ введения лекарственных препаратов, минуя желудочно-кишечный тракт
- в) наружное применение лекарственных средств
- г) введение лекарственных средств путем клизмы
- д) сублингвальный прием лекарств

3. Укажите неотложную помощь при приступе стенокардии:

- а) пузырь со льдом на грудную клетку
- б) прием нитроглицерина
- в) постановка банок
- г) массаж грудной клетки
- д) ингаляции нашатырного спирта

4. Каково положение больного с сердечной астмой при транспортировке:

- а) лежа на спине
- б) полусидячее
- в) лежа на боку
- г) лежа на животе
- д) не имеет значения

5. Артериальной гипертонией согласно критериям ВОЗ является уровень АД выше:

- а) 140 / 90 мм рт ст

- б) 160 / 95 мм рт ст
- в) 160 / 90 мм рт ст
- г) 120 / 80 мм рт ст
- д) любой уровень АД, если пациент чувствует себя некомфортно

6. Укажите доврачебное мероприятие при обмороке:

- а) поставить горчичники на икроножные мышцы
- б) поставить горчичники на воротниковую зону
- в) дать вдохнуть пары нашатырного спирта
- г) дать одну таблетку валидола
- д) приподнять головной конец кровати

7. Какое положение занимают больные при почечной колике:

- а) спокойное
- б) вынужденное
- в) мечутся
- г) лежат
- д) сидя, с опущенными ногами

8. режим работы медицинского персонала определяется

- А) функциями, типом и структурой медицинской организации
- Б) количеством врачей
- В) количеством среднего медперсонала
- Г) количеством младшего медперсонала

9. В рацион больного сахарным диабетом включают все, кроме:

- а) мясного суфле
- б) отварной рыбы
- в) творога
- г) гречневой каши
- д) винограда

10. Что способствует распространению внутрибольничных инфекций:

- а) нарушение правил асептики и антисептики в больнице
- б) появление в отделениях клопов и тараканов
- в) появление в отделениях больных с педикулезом
- г) посещение больного родственниками
- д) хранение в палате домашней одежды больного

11. Как часто следует проводить влажную уборку палат:

- а) ежедневно по мере необходимости
- б) ежедневно
- в) не реже 2 раз в день
- г) через день
- д) 1 раз в неделю

12. В чем заключается основное назначение функциональной кровати:
- а) позволяет придать больному наиболее выгодное и удобное положение
 - б) ее можно легко и быстро передвигать
 - в) облегчает медперсоналу выполнение их функций по лечению и уходу за больным
 - г) облегчает уборку помещения
 - д) облегчает контакт врача с больным
13. Какие меры обеспечивают эффективный дренаж бронхов при хроническом обструктивном бронхите:
- а) назначение отхаркивающих средств
 - б) ингаляции
 - в) массаж грудной клетки
 - г) постуральный дренаж
 - д) все перечисленное
14. Какие рекомендации может дать медицинская сестра пациенту с хроническим бронхитом:
- а) объяснить необходимость приема назначенных препаратов
 - б) обучить методике постурального дренажа
 - в) ознакомить с методами вторичной профилактики хронического бронхита
 - г) все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
15. Независимое сестринское вмешательство при желудочном кровотечении:
- а) промывание желудка
 - б) очистительная клизма
 - в) грелка на живот
 - г) пузырь со льдом на живот
16. Что такое олигурия:
- а) количество мочи, выделенное за сутки, менее 500 мл
 - б) количество мочи, выделенное за сутки, менее 50 мл
 - в) количество мочи, выделенное за сутки, менее 200 мл
 - г) количество мочи, выделенное за сутки, более 2000 мл
 - д) задержка мочи
17. Для чего делают бактериологический анализ мочи:
- а) для выделения возбудителя болезни
 - б) чтобы подобрать антибиотик
 - в) для определения протеинурии
 - г) для определения удельного веса мочи

д) для определения выраженности лейкоцитурии

18. В каких случаях лекарственные препараты назначают внутрь после приема пищи:

- а) если они раздражают слизистую оболочку желудка
- б) если они участвуют в процессах пищеварения
- в) если они разрушаются желудочным соком
- г) если на данный препарат у пациента отмечалась аллергическая реакция
- д) по желанию пациента

19. Какие осложнения связаны с нарушением правил асептики и антисептики при проведении инъекций:

- а) воздушная и жировая эмболия
- б) аллергические реакции
- в) развитие постинъекционных инфильтратов и абсцессов
- г) дизентерия

20. Какие показатели отражены в температурном листе:

- а) графическое изображение температурной кривой
- б) графическое изображение температурной кривой, кривых пульса, частоты дыхания, артериальное давление, масса тела, диурез
- в) графическое изображение температурной кривой, кривых пульса, частоты дыхания, результаты врачебных осмотров
- г) графическое изображение кривой пульса
- д) графическое изображение частоты дыхания

21. При какой патологии может развиваться кровохарканье:

- а) рак легкого
- б) туберкулез легких
- в) бронхоэктатическая болезнь
- г) все перечисленное
- д) ничего из перечисленного

22. Отеки при заболеваниях сердца имеют следующий характер:

- а) начинаются с лица, рыхлые, бледные
- б) начинаются с нижних конечностей, цветные (цианотичные), плотные
- в) локализуются преимущественно в полостях
- г) распространенные, типа анасарки

23. Укажите, что характерно для сердечной недостаточности:

- а) отеки
- б) брадикардия

- в) коллапс
- г) повышение АД
- д) боли в области сердца

24. Определите подготовку больного к цистоскопии:

- а) провести масляную клизму
- б) больной должен помочиться
- в) ввести газоотводную трубку
- г) выполнить термометрию
- д) исключить прием пищи перед исследованием

25. Какие симптомы характерны для гипогликемической комы:

- а) усиление потоотделения, судороги, низкий уровень сахара в крови
- б) сухость кожи, снижение тонуса мышц, высокий уровень сахара в крови
- в) сухость кожи, запах аммиака изо рта, дыхание Куссмауля, сахар в крови не изменен
- г) гиперемия слизистых, непроизвольные дефекация и мочеиспускание, запах алкоголя изо рта
- д) развитие парезов и параличей

26. Какие из указанных продуктов не рекомендуется употреблять при ожирении:

- а) черный хлеб
- б) мясо
- в) рыба
- г) вкусовые приправы
- д) гречневая каша

27. Основные клинические признаки диабетической комы все, кроме:

- а) глубокое шумное дыхание
- б) запах ацетона изо рта
- в) влажная кожа
- г) высокий сахар в крови
- д) высокая гликозурия

28. Обязательное медицинское страхование работающего населения осуществляется за счет:

- а) отчислений из местного бюджета
- б) страховых взносов предприятий и учреждений
- в) личных средств граждан
- г) все ответы верные

29. Документ, разрешающий медицинскому учреждению указанный в нем вид деятельности:
- а) лицензия
 - б) приказ
 - в) сертификат
 - г) диплом
30. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то считается, что:
- а) договор заключен на неопределенный срок
 - б) договор не заключен
 - в) работодатель может расторгнуть его в любое время
 - г) работник может расторгнуть его в любое время
31. Если трудовой договор не оформлен надлежащим образом, но работник фактически допущен к работе, то работодатель обязан:
- а) оформить с работником трудовой договор до истечения трех дней со дня фактического допущения к работе
 - б) оформить с работником трудовой договор до истечения недели со дня фактического допущения к работе
 - в) отстранить работника от работы
 - г) оформить с работником трудовой договор по истечении срока испытания
32. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам:
- а) 3 дня
 - б) 1 месяц
 - в) 3 месяца
 - г) 10 дней
33. Независимые сестринские вмешательства включают:
- а) кормление пациента
 - б) запись ЭКГ
 - в) в/м инъекции
 - г) постановку капельницы
34. Зависимые сестринские вмешательства включают:
- а) подготовку пациента к исследованию
 - б) в/м, в/в, п/к инъекции
 - в) мероприятия по личной гигиене тяжелобольных
 - г) кормление больных
35. Эмпатия – это:
- а) полная схожесть убеждений, мнений, эмоционального состояния партнеров

- б) умение манипулировать людьми в своих целях
- в) способность внушать окружающим свои мысли
- г) умение распознавать эмоции окружающих, откликаться на них

36. Способ предупреждения конфликтов в профессиональной деятельности медсестры:

- а) консенсус
- б) обсуждение в коллективе
- в) полемика
- г) все ответы верные

37. К ятрогенным относятся заболевания:

- а) обусловленные вредными факторами производства
- б) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
- в) с неблагоприятным прогнозом
- г) наследственного генеза

38. Стойкость ВИЧ к факторам внешней среды:

- а) малоустойчив, при температуре 56°C инактивируется за 30 минут, при температуре 100°C – за 1-5 минут)
- б) устойчив во внешней среде, погибает только при автоклавировании
- в) малоустойчив к дезинфекционным средствам
- г) устойчив к высоким температурам

39. Запас лекарственных препаратов на посту палатной медсестры должен быть рассчитан на:

- а) 3 дня
- б) 7 дней
- в) 10 дней
- г) 2 недели

40. Острая левожелудочковая недостаточность проявляется:

- а) обмороком
- б) шоком
- в) коллапсом
- г) отеком легких

41. Синдром острой сосудистой недостаточности характеризуется:

- а) сердечной астмой, отеком легких
- б) шоком, коллапсом, обмороком
- в) гипертермией
- г) анурией

42. Диета при гипертонической болезни предполагает:

- а) ограничение жидкости и соли
- б) увеличение потребления жидкости и белков
- в) ограничение жиров и белков
- г) увеличение потребления жиров и белков

43. Потенциальная проблема пациента при гипертоническом кризе:

- а) асцит
- б) острая сосудистая недостаточность
- в) кровохарканье
- г) сердечная недостаточность

44. Независимое сестринское вмешательство при гипертоническом кризе:

- а) введение пентамина
- б) введение лазикса
- в) холод на грудную клетку
- г) горчичники на икроножные мышцы

45. Зависимое сестринское вмешательство при гипертоническом кризе – введение:

- а) энапа
- б) анальгина
- в) панангина
- г) морфина

46. Основной симптом стенокардии:

- а) слабость
- б) сжимающая, давящая боль
- в) одышка
- г) тошнота

47. Загрудинная боль, иррадиирующая под левую лопатку, продолжительностью 5-10 минут, наблюдается при:

- а) инфаркте миокарда
- б) ревмокардите
- в) остеохондрозе
- г) стенокардии

48. Независимое сестринское вмешательство при появлении сжимающей загрудинной боли:

- а) введение морфина
- б) введение анальгина
- в) нитроглицерин под язык
- г) димедрол внутрь

49. Эффект действия нитроглицерина наступает через:

- а) 1-3 мин
- б) 10-15 мин
- в) 20-25 мин
- г) 30-40 мин

50. Длительность боли при стенокардии – не более:

- а) 20 минут
- б) 60 минут
- в) 120 минут
- г) 180 минут

51. При инфаркте миокарда наблюдается:

- а) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
- б) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
- в) колющая боль в области сердца
- г) ноющая боль в области сердца

52. Клинические симптомы кардиогенного шока:

- а) лихорадка, рвота
- б) приступ удушья
- в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс
- г) резкое повышение АД, напряженный пульс

53. При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод:

- а) зеленый
- б) желтый
- в) красный
- г) черный

54. В первые дни заболевания медсестра контролирует соблюдение больным инфарктом миокарда режима:

- а) строгого постельного
- б) постельного
- в) палатного
- г) общего

55. Обморок – это форма острой недостаточности:

- а) коронарной
- б) левожелудочковой
- в) правожелудочковой
- г) сосудистой

56. Независимое сестринское вмешательство при обмороке:

- а) введение пентамина
- б) введение мезатона

- в) рефлекторное воздействие нашатырного спирта
- г) проведение оксигенотерапии через пеногасители

57. Медсестра накладывает венозные жгуты на конечности при:

- а) бронхиальной астме
- б) обмороке
- в) стенокардии
- г) сердечной астме

58. Отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени являются признаками:

- а) инфаркта миокарда
- б) недостаточности кровообращения
- в) стенокардии
- г) гипертонической болезни

59. Для сбора мокроты на бактериологическое исследование необходимо приготовить:

- а) карманную плевательницу
- б) чистую сухую стеклянную баночку с крышкой
- в) стерильный контейнер с крышкой
- г) любую посуду из перечисленных

60. Тактика медсестры при легочном кровотечении:

- а) обеспечить больному полный покой, вызвать врача
- б) поставить грелку на грудную клетку
- в) поставить горчичники на грудную клетку
- г) провести оксигенотерапию

61. Основной фактор риска хронического бронхита:

- а) курение
- б) бактериальная и вирусная инфекция
- в) переохлаждение
- г) гиповитаминоз

62. Характер мокроты при остром бронхите:

- а) слизистая
- б) стекловидная
- в) «ржавая»
- г) розовая пенная

63. Основной симптом при бронхиальной астме:

- а) инспираторная одышка
- б) кашель с гнойной мокротой
- в) кровохарканье

- г) приступ удушья
64. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы:
- а) горизонтальное
 - б) горизонтальное с приподнятыми ногами
 - в) лежа на боку
 - г) сидя, с упором на руки
65. Дренажное положение придается пациенту с целью:
- а) снижения лихорадки
 - б) уменьшения одышки
 - в) расширения бронхов
 - г) облегчения отхождения мокроты
66. При сборе мокроты на общий анализ пациента необходимо обеспечить:
- а) сухой пробиркой
 - б) сухой банкой
 - в) стерильной пробиркой
 - г) стерильной банкой
67. Индивидуальная карманная плевательница должна быть заполнена на 1/4:
- а) водой
 - б) физраствором
 - в) 25% раствором соды
 - г) хлорамином
68. Приоритетная проблема пациента после прорыва абсцесса легкого в бронх:
- а) лихорадка
 - б) слабость
 - в) кровохарканье
 - г) кашель с гнойной мокротой
69. Потенциальная проблема пациента при раке легкого:
- а) лихорадка
 - б) прибавка массы тела
 - в) головная боль
 - г) легочное кровотечение
70. Независимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении:
- а) введение хлорида кальция внутривенно
 - б) введение аминапроновой кислоты
 - в) тепло на грудную клетку
 - г) холод на грудную клетку

71. Для плевральной пункции медсестра готовит:
- а) иглу длиной 10-15 см
 - б) иглу Дюфо
 - в) иглу Кассирского
 - г) троакар
72. Основной симптом эмфиземы легких:
- а) боль в грудной клетке
 - б) влажный кашель
 - в) кровохарканье
 - г) одышка
73. Независимое сестринское вмешательство при желудочно-кишечном кровотечении:
- а) в/м введение викасола
 - б) в/в введение хлористого кальция
 - в) пузырь со льдом на живот
 - г) введение анальгетиков
74. Приоритетная проблема пациента при желчекаменной болезни:
- а) диарея
 - б) печеночная колика
 - в) желтушность кожи
 - г) кожный зуд
75. При подготовке пациента к желудочному зондированию очистительная клизма:
- а) ставится вечером накануне исследования
 - б) ставится утром в день исследования
 - в) ставится вечером и утром
 - г) не ставится
76. Подготовка пациента к желудочному зондированию:
- а) вечером – легкий ужин, утром – исследование проводится натощак
 - б) вечером – очистительная клизма
 - в) вечером и утром – очистительная клизма
 - г) утром – сифонная клизма
77. Подготовка пациента к эндоскопическому исследованию пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:
- а) вечером – легкий ужин, утром – исследование проводится натощак
 - б) вечером – очистительная клизма
 - в) вечером и утром – очистительная клизма
 - г) утром – сифонная клизма

78. Для стимуляции желудочной секреции медсестра использует:
- а) пентагастрин
 - б) растительное масло
 - в) сульфат бария
 - г) сульфат магния
79. При хроническом гастрите из рациона исключают:
- а) жирную, жареную пищу
 - б) молочные продукты
 - в) кашу
 - г) овощи и фрукты
80. Основная причина возникновения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки:
- а) переохлаждение, переутомление
 - б) хеликобактериальная инфекция
 - в) физическая перегрузка, переохлаждение
 - г) вирусная инфекция, переохлаждение
81. Подготовка пациента к рентгенографии желудка:
- а) вечером – легкий ужин, утром – исследование проводится натощак
 - б) вечером и утром – очистительная клизма
 - в) утром – сифонная клизма
 - г) за 3 дня до исследования исключить железосодержащие продукты
82. Самое частое осложнение язвенной болезни:
- а) кишечная непроходимость
 - б) кахексия
 - в) обезвоживание
 - г) желудочное кровотечение
83. При подготовке пациента к анализу кала на скрытую кровь следует отменить препараты:
- а) железа
 - б) магния
 - в) калия
 - г) кальция
84. Зависимое сестринское вмешательство при желудочном кровотечении – введение:
- а) хлорида кальция, дицинона
 - б) гепарина, димедрола
 - в) дибазола, папаверина
 - г) пентамина, клофелина

85. При запоре медсестра рекомендует пациенту употреблять большое количество:
- а) белков
 - б) жиров
 - в) углеводов
 - г) продуктов, богатых пищевыми волокнами
86. Элемент подготовки пациента к ректороманоскопии:
- а) масляная клизма утром
 - б) сифонная клизма вечером
 - в) сифонная клизма утром
 - г) очистительная клизма накануне и за 2 часа до исследования
87. Пациента с хроническим некалькулезным холециститом медсестра должна обучить:
- а) измерять АД
 - б) делать тюбаж
 - в) подсчитывать суточный диурез
 - г) контролировать массу тела
88. При подготовке пациента к дуоденальному зондированию очистительная клизма:
- а) ставится вечером накануне исследования
 - б) ставится утром в день исследования
 - в) ставится вечером и утром
 - г) не ставится
89. Зависимое сестринское вмешательство при приступе печеночной колики – введение
- а) строфантина, коргликона
 - б) баралгина, но-шпы
 - в) димедрола, супрастина
 - г) клофелина, лазикса
90. Приоритетная проблема пациента при мочекаменной болезни:
- а) почечная колика
 - б) задержка мочи
 - в) жажда
 - г) слабость, сонливость
91. При почечной колике показано введение:
- а) лазикса
 - б) баралгина
 - в) гепарина
 - г) строфантина

92. Приоритетные проблемы пациента при остром гломерулонефрите:
- а) слабость, недомогание
 - б) повышенная утомляемость, лихорадка
 - в) снижение работоспособности и аппетита
 - г) головная боль, отеки
93. Мочу для общего клинического анализа медсестра должна доставить в лабораторию в течение:
- а) 1 часа
 - б) 3 часов
 - в) 5 часов
 - г) 7 часов
94. управление сестринской деятельностью в медицинской организации осуществляет
- А) главная медицинская сестра
 - Б) старшая медицинская сестра
 - В) главный врач
 - Г) заместитель главного врача по лечебному делу
95. При хроническом гломерулонефрите с выраженной азотемией назначают диету:
- а) основной вариант стандартной
 - б) вариант с пониженным количеством белка
 - в) вариант с пониженной калорийностью
 - г) вариант с повышенным количеством белка
96. Для проведения анализа мочи по методу Нечипоренко медсестра отправляет в лабораторию:
- а) 50 мл свежесобранной теплой мочи
 - б) 100-200 мл мочи из суточного количества
 - в) 10-часовую порцию мочи
 - г) 10-50 мл мочи из средней порции
97. Никтурия – это:
- а) уменьшение суточного количества мочи до менее 500 мл
 - б) увеличение суточного количества мочи до более 2000 мл
 - в) преобладание ночного диуреза над дневным
 - г) болезненное мочеиспускание
98. При уходе за пациентами в состоянии уремии медсестра применяет:
- а) банки
 - б) горчичники
 - в) горячие ванны

г) очистительную клизму

99. При ожирении медсестра рекомендует пациенту диету:

- а) вариант с пониженным содержанием белка
- б) вариант с пониженной калорийностью
- в) основной вариант стандартной
- г) вариант с повышенным содержанием белка

100. организует и координирует работу медицинских сестёр отделения (подразделения), находящихся в ее подчинении

- А) старшая медицинская сестра
- Б) палатная (постовая) медсестра
- В) заведующий отделением
- Г) младшая медсестра по уходу

101. Основная проблема пациента с тиреотоксикозом:

- а) вялость
- б) сонливость
- в) раздражительность
- г) заторможенность

102. Основная проблема пациента с гипотиреозом:

- а) раздражительность
- б) чувство жара
- в) бессонница
- г) сонливость

103. При недостаточном содержании йода в пище развивается:

- а) диффузный токсический зоб
- б) ожирение
- в) сахарный диабет
- г) эндемический зоб

104. Симптомы сахарного диабета:

- а) жажда, кожный зуд
- б) отёки, боли в пояснице
- в) сухой кашель, одышка
- г) снижение памяти, запоры

105. Основные симптомы гипогликемического состояния:

- а) боли в области сердца, одышка
- б) одышка, сухой кашель
- в) отеки, головная боль
- г) чувство голода, потливость

106. Независимое сестринское вмешательство при гипогликемическом состоянии:
- а) ввести дибазол
 - б) ввести инсулин
 - в) напоить сладким чаем
 - г) напоить отваром шиповника
107. Зависимое сестринское вмешательство при гипогликемической коме – введение:
- а) инсулина
 - б) глюкозы
 - в) морфина
 - г) нитроглицерина
108. Пациенту с язвенной болезнью желудка в период обострения рекомендуется диета:
- а) вариант с повышенным содержанием белка
 - б) вариант с механическим и химическим щажением
 - в) вариант с пониженной калорийностью
 - г) основной вариант стандартной
109. Медсестра рекомендует пациенту запивать препараты железа:
- а) кофе
 - б) кислым фруктовым соком
 - в) минеральной водой
 - г) чаем
110. Основная причина развития витамин В₁₂-дефицитной анемии:
- а) атрофический гастрит
 - б) кровохарканье
 - в) обильные менструации
 - г) геморрой
111. Подготовка пациента к стеральной пункции:
- а) очистительная клизма
 - б) исключение из рациона железосодержащих продуктов
 - в) разъяснение сущности процедуры
 - г) не проводится
112. Элемент ухода при железодефицитной анемии:
- а) включение в пищевой рацион достаточного количества мяса
 - б) частая термометрия
 - в) составление рациона с механически и химически щадящей пищей
 - г) ограничение пребывания на воздухе

113. Препараты, чаще вызывающие аллергическую реакцию:
- а) антибиотики
 - б) диуретики
 - в) гипотензивные
 - г) цитостатики
114. Неотложную помощь при анафилактическом шоке начинают оказывать:
- а) в палате
 - б) в реанимационном отделении
 - г) в приемном отделении
 - г) на месте развития
115. Искусственную вентиляцию легких продолжают до:
- а) частоты дыхания 5 в минуту
 - б) частоты дыхания 10 в минуту
 - в) частоты дыхания 20 в минуту
 - г) восстановления адекватного самостоятельного дыхания
116. Неэффективная реанимация прекращается через:
- а) 5 минут
 - б) 15 минут
 - в) 30 минут
 - г) до 1 часа
117. более подвержены нервному истощению медсестры
- А) одержимые работой, стремящиеся к высоким результатам, очень обязательные
 - Б) умеющие организовать работу и отдых
 - В) необязательные люди
 - Г) сочетающие работу с домашними и другими обязанностями
118. Запах ацетона изо рта характерен для комы:
- а) гипогликемической
 - б) гипергликемической
 - в) уремической
 - г) мозговой
119. Антидотом при отравлении опиатами является:
- а) налоксон
 - б) активированный уголь
 - в) физиологический раствор
 - г) атропин
120. нейтрализация ртути и ее паров называется

- А) демеркуризация
- Б) дератизация
- В) дезинсекция
- Г) дезинфекция

121. Укажите, с какой целью проводится контрольное кормление и взвешивание детей:

- а) определение фактического веса ребёнка
- б) определение количества женского молока, съеденного за одно кормление
- в) определение суточного объёма питания
- г) определение месячной прибавки массы тела ребёнка

122. Для проведения гигиенической ванны новорождённому ребёнку не требуется:

- а) детское мыло
- б) водный термометр
- в) кувшин с водой
- г) губка

123. Чем проводят туалет глаз ребёнку грудного возраста:

- а) борным спиртом
- б) кипячёной водой
- в) растительным маслом
- г) водным раствором йода

124. Чем проводится обработка кожных складок у ребёнка грудного возраста:

- а) стерильным растительным маслом
- б) раствором йода
- в) раствором фурацилина
- г) настоями трав

125. Укажите температуру смеси для кормления:

- а) комнатной
- б) 30-35⁰ С
- в) 36-38⁰С
- г) 40-45⁰С

126. Продолжительность купания новорождённого:

- а) 3-5 минут
- б) 8-10 минут
- в) 15-20 минут
- г) 10-15 минут

127. Чем проводят туалет носа ребёнку грудного возраста:

- а) борным спиртом
- б) кипячёной водой
- в) стерильным растительным маслом
- г) раствором фурациллина

128. Чем проводят обработку полости рта новорождённому:

- а) раствором фурациллина
- б) перекисью водорода
- в) раствором пищевой соды
- г) не проводят

129. С какого дня жизни разрешено купание новорождённого:

- а) сразу после выписки из роддома
- б) после заживления пупочной ранки
- в) с 3-й недели жизни
- г) с 1 месяца

130. наилучшей защитой для персонала, который по характеру работы подвергается воздействию облучения, является

- А) расстояние, укрытие и скорость процедуры
- Б) расстояние и укрытие
- В) расстояние
- Г) учет полученной дозы облучения

131. Укажите направление движения тампона при проведении туалета глаз новорождённому:

- а) от внутреннего угла глаза к наружному
- б) от наружного угла глаза к внутреннему
- в) круговыми движениями
- г) направление значения не имеет

132. Укажите температуру воды для купания:

- а) комнатная
- б) 33-35⁰С
- в) 36-37⁰С
- г) 38-40⁰ С

133. Укажите соматоскопический показатель физического развития

- а) длина туловища:
- б) осанка
- в) окружность головы
- г) масса тела

134. Когда ребенок начинает ходить самостоятельно:

- а) в 6 месяцев

- б) в 9 месяцев
- в) в 1 год
- г) в 1,5 года

135. Доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы:

- а) Ввести эуфиллин внутривенно
- б) Провести ингаляцию беротека
- в) Ввести эуфиллин внутримышечно
- г) Использовать дренажные положения

136. При сухом кашле применяется:

- а) дренаж положением
- б) горячие ножные ванны
- в) вибрационный массаж
- г) холодный компресс на грудную клетку

137. Что не является элементом лечебно-охранительного режима детской больницы:

- а) двигательные режимы
- б) режим дня
- в) щажение психики больного
- г) влажная уборка палат с хлорамином

138. При поступлении в приемное отделение стационара тяжелобольного пациента медицинская сестра должна в первую очередь:

- а) транспортировать пациента в реанимационное отделение
- б) начать оказание неотложной доврачебной помощи, срочно вызвать дежурного врача
- в) провести санобработку
- г) оформить необходимую медицинскую документацию

139. Температура воды, используемая для смачивания горчичников:

- а) 36-37° С
- б) 20-30° С
- в) 40-45° С
- г) 60-70° С

140. В первом периоде лихорадки возможно применение:

- а) пузыря со льдом
- б) грелки
- в) влажного обертывания
- г) холодного компресса

141. Почему при проведении искусственного дыхания необходимо запрокидывать голову больного:

- а) чтобы удобнее было приложить рот реаниматора к носу или рту больного
- б) чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей
- в) чтобы создать хорошую герметизацию между ртом реаниматора и носом (или ртом) пострадавшего при проведении искусственного вдоха
- г) для профилактики аспирации слизи в верхние дыхательные пути

142. факторы, влияющие на безопасность больничной среды для пациентов и медперсонала

- А) химические, шум, вибрация, ультразвук, излучения, условия труда
- Б) санитарно-противоэпидемический режим
- В) условия отдыха
- Г) рациональное питание, водоснабжение

143. Укажите частоту проведения гигиенической ванны для новорожденного:

- а) ежедневно
- б) через день
- в) через 2 дня
- г) 2 раза в неделю

144. Критерий правильности наложения жгута перед внутривенной инъекцией:

- а) бледность кожи ниже жгута
- б) отсутствие пульса на лучевой артерии
- в) багровая окраска кожи ниже жгута
- г) багровая окраска кожи выше жгута

145. Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента каждые:

- а) 2 часа
- б) 12 часов
- в) 18 часов
- г) 24 часа

146. Медсестра регистрирует стул ребенка:

- а) в истории болезни
- б) в температурном листе
- в) в журнале приема и сдачи дежурств
- г) в порционном требовании

147. При дуоденальном зондировании пациента укладывают:

- а) на левый бок
- б) на правый бок
- в) на живот
- г) на спину

148. В журнале регистрации поступивших больных медсестра заполняет:

- а) паспортную часть
- б) анамнез заболевания
- в) результаты ежедневного осмотра
- г) диагноз при выписке

149. К игрушкам для детей грудного возраста предъявляются все требования, кроме:

- а) они должны быть яркими
- б) они должны быть звучащими
- в) они должны быть мелкими
- г) они должны быть чистыми

150. Чем проводится дезинфекция клизмменных наконечников:

- а) хлорамином
- б) уксусом
- в) фурациллином
- г) йодом

151. Действие горчичников основано на раздражении:

- а) барорецепторов
- б) терморецепторов
- в) механорецепторов
- г) хеморецепторов

152. При влажном кашле применяется:

- а) дренаж положением
- б) ножные горячие ванны
- в) противокашлевые препараты
- г) пузырь со льдом на грудную клетку

153. Укажите необходимый инвентарь для сбора мочи у мальчика 2-х месяцев:

- а) клеёнка
- б) пробирка, лейкопластырь
- в) подкладной круг, металлическая тарелка
- г) горшок

154. Количество капель, закапываемых в конъюнктивальный мешок:

- а) 1 - 2 капли
- б) 2 - 3 капли
- в) 3 - 4 капли
- г) 4 - 5 капель

155. Укажите подготовку перед взятием перианального соскоба на острицы:
- а) ребёнка подмыть
 - б) сделать очистительную клизму
 - в) поставить газоотводную трубку
 - г) специальная подготовка не проводится
156. Механизм развития коллапса:
- а) спазм сосудов головного мозга
 - б) падение сосудистого тонуса
 - в) повышение активности свёртывающей системы крови
 - г) повышение артериального давления
157. Какое свойство пульса изменяется при повышении АД:
- а) ритм
 - б) напряжение
 - в) частота
 - г) симметричность на обеих руках
158. Положение ребенка при обмороке
- а) уложить на спину, повернуть голову набок
 - б) уложить с приподнятым головным концом
 - в) уложить с приподнятым ножным концом
 - г) полусидячее
159. Температура воды, используемая для горячего компресса:
- а) 36-37° С
 - б) 20-30° С
 - в) 40-45° С
 - г) 60-70° С
160. Укажите соматометрический показатель физического развития:
- а) биологический возраст
 - б) форма ног
 - в) окружность грудной клетки
 - г) форма стопы
161. Сколько тонких пеленок необходимо иметь в наборе белья для новорождённых:
- а) 4 - 6 штук
 - б) 8-12 штук
 - в) 15-20 штук
 - г) 20-25 штук
162. Что такое анурия:
- а) количество мочи, выходяемое за сутки, менее 50 мл

- б) количество мочи, выделяемое за сутки, около 500 мл
- в) количество мочи, выделяемое за сутки, 1500 мл
- г) задержка мочи

163. Субфебрильная температура тела это:

- а) 39-41° С
- б) 37-38° С
- в) 38-39° С
- г) >41° С

164. Укажите педикулоцид для обработки волосистой части головы:

- а) ниттифор
- б) перманганат калия
- в) бриллиантовая зелень
- г) беродуал

165. Кал на общий анализ берется:

- а) в чистую сухую баночку
- б) в стерильную сухую баночку
- в) в чашку Петри
- г) в чистую баночку с консервантом

166. ответственность за организацию безопасной рабочей среды несет

- А) работодатель
- Б) работник
- В) пациент
- Г) профсоюз

167. К острой сосудистой недостаточности относится всё, кроме:

- а) шок
- б) коллапс
- в) сердечная астма
- г) обморок

168. В анализе мочи по Зимницкому определяют:

- а) удельный вес мочи
- б) содержание форменных элементов крови
- в) бактерии
- г) суточную экскрецию оксалатов

169. Укажите положение головы пациента при закапывании капель в нос:

- а) запрокинута
- б) запрокинута и повёрнута в противоположную сторону
- в) запрокинута и повёрнута в сторону закапывания

г) положение значения не имеет

170. Лабораторная посуда для сбора мокроты на общий анализ:

- а) стерильная чашка Петри
- б) пробирка
- в) чистый широкогорлый флакон емкостью 100-150 мл
- г) лоток

171. Для постановки очистительной клизмы у детей грудного возраста используется:

- а) резиновая груша
- б) газоотводная трубка
- в) кружка Эсмарха
- г) зонд с воронкой

172. Укажите частоту сердечных сокращений у новорожденного:

- а) 60-80 ударов в минуту
- б) 80-100 ударов в минуту
- в) 100-120 ударов в минуту
- г) 120-140 ударов в минуту

173. Медицинская сестра приемного отделения стационара заполняет:

- а) лист назначений
- б) температурный лист
- в) титульный лист истории болезни
- г) больничный листок

174. К показателям нервно-психического развития относятся все, кроме:

- а) статико-моторное развитие
- б) развитие речи
- в) биологический возраст
- г) наличие безусловных рефлексов

175. Показание для постановки пузыря со льдом:

- а) туберкулёз лёгких
- б) остаточные явления травм
- в) опухоль органов грудной клетки
- г) лёгочное кровоотечение

176. Укажите доврачебную помощь во второй период лихорадки:

- а) пузырь со льдом на голову
- б) горячий чай
- в) укутывание
- г) грелка к ногам

177. Показания для постановки согревающего компресса:

- а) лёгочное кровотечение
- б) аппендицит
- в) отит
- г) абсцесс подкожно-жировой клетчатки

178. Частота дыхания здорового новорожденного:

- а) 10-12 в 1 мин.
- б) 16-20 в 1 мин.
- в) 22-28 в 1 мин.
- г) 40-60 в 1 мин.

179. Частота стула у здорового новорожденного на естественном вскармливании:

- а) 1-2 раза в сутки
- б) 5-6 раз в сутки
- в) 7-9 раз в сутки
- г) 10-12 раз в сутки

180. Частота мочеиспусканий у новорожденных:

- а) 4-7 раз в сутки
- б) 7-10 раз в сутки
- в) 10-14 раз в сутки
- г) 20-24 раз в сутки

181. Как проводится дезинфекция бутылочек для смесей:

- а) кипячением
- б) мыльным раствором с применением ёршика
- в) раствором горчицы с применением ершика
- г) раствором соды с применением ёршика

182. Когда ребенок начинает самостоятельно сидеть:

- а) в 2 месяца
- б) в 6 месяцев
- в) в 9 месяцев
- г) в 12 месяцев

183. Укажите показатель нервно-психического развития:

- а) рост
- б) эмоции
- в) биологический возраст
- г) масса тела

184. При ночном недержании мочи у женщины лучше использовать:

- а) металлическое судно

- б) подгузники
- в) съемный мочеприемник
- г) резиновое судно

185. Что такое одышка:

- а) увеличение частоты дыхания
- б) изменение ритма дыхания
- в) увеличение глубины дыхания
- г) изменение частоты, глубины, ритма дыхания, соотношения фаз вдоха и выдоха

186. Медицинская сестра приемного отделения стационара заполняет:

- а) порционное требование
- б) температурный лист
- в) статистическую карту выбывшего из стационара
- г) больничный листок

187. В анализе мочи по Нечипоренко определяют:

- а) удельный вес мочи
- б) содержание форменных элементов крови
- в) бактерии
- г) суточную экскрецию оксалатов

188. Что не применяется при легочном кровотечении:

- а) пузырь со льдом
- б) грелка
- в) строгий постельный режим
- г) вынужденное положение

189. самым надежным методом контроля качества стерилизации является

- 1) бактериологический
- 2) химический
- 3) физический
- 4) механический

190. физический контроль режима стерилизации предусматривает

- 1) показания контрольно-измерительных приборов стерилизатора
- 2) использование индикаторов
- 3) использование биотестов
- 4) контроль влажности обработанных изделий

191. Что не является средством закаливания:

- а) вода
- б) солнце
- в) воздух

г) массаж

192. для альдегидсодержащих средств характерно

- 1) высокая токсичность
- 2) малотоксичны
- 3) без запаха
- 4) узкого спектра действия

193. Приоритетом в сохранении здоровья человека и семьи в рамках первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) является:

- а) профилактическая работа
- б) лекарственное обеспечение
- в) диагностика болезней
- г) лечение болезней

194. Приоритетом в борьбе с инфекциями в рамках ПМСП является:

- а) диагностика инфекционных болезней
- б) лечение инфекционных болезней
- в) управление инфекциями средствами иммунопрофилактики
- г) карантинные мероприятия

195. Действие медсестры, способное разрешить проблемы пациента без консультации и сотрудничества с врачом:

- а) независимое сестринское вмешательство
- б) зависимое сестринское вмешательство
- в) взаимозависимое сестринское вмешательство
- г) любое сестринское вмешательство

196. При осуществлении сестринского процесса обязательным является:

- а) участие пациента (членов семьи) в определении целей, планировании и реализации ухода, оценке его эффективности
- б) оценка эффективности ухода лечащим врачом
- в) согласование всех действий медсестры с врачом
- г) удовлетворение всех нарушенных потребностей пациента

197. Сестринский диагноз – это:

- а) название болезни
- б) симптом
- в) синдром
- г) проблема пациента и ее вероятная причина

198. Сестринский диагноз отражает:

- а) патофизиологическую сущность болезни
- б) реакцию пациента на болезнь
- в) способность пациента к осуществлению самоухода

г) состояние функциональных систем организма

199. Документ, который ведется в детской поликлинике на каждого ребенка:

- а) ф. 58
- б) ф. 112
- в) ф. 30
- г) ф. 26

200. Перепись детского населения в поликлинике проводится:

- а) 1 раз в год
- б) 1 раз в 6 месяцев
- в) 1 раз в 3 месяца
- г) ежемесячно

201. Перепись детского населения проводит:

- а) участковая сестра
- б) участковый врач
- в) родители
- г) старшая сестра поликлиники

202. В детской поликлинике обслуживаются дети в возрасте:

- а) до 14 лет
- б) до 15 лет
- в) до 16 лет
- г) до 18 лет

203. Здоровые дети первого года жизни должны проходить осмотр в детской поликлинике:

- а) ежемесячно
- б) ежеквартально
- в) 2 раза в месяц
- г) 1 раз в 6 месяцев

204. Период грудного возраста длится:

- а) от момента рождения до 1 года
- б) от 1 месяца до 1 года
- в) от момента рождения до 1 месяца
- г) с 1 месяца до 3 лет

205. Возрастные границы дошкольного периода детства:

- а) 1-3 года
- б) 1-5 лет
- в) 3-7 лет
- г) 4-8 лет

206. Сроки закрытия большого родничка:

- а) 6 месяцев
- б) 8-10 месяцев
- в) 12-16 месяцев
- г) 18-24 месяца

207. Пассивный иммунитет, полученный от матери, у ребенка ослабевает:

- а) во втором полугодии жизни
- б) к 2 годам
- в) к 3 годам
- г) к 5 годам

208. Частота дыхания в возрасте 1-2 года:

- а) 40-60 в минуту
- б) 30-35 в минуту
- в) 20-25 в минуту
- г) 16-18 в минуту

209. Частота дыхания в возрасте 10 лет:

- а) 30-35 в минуту
- б) 18-20 в минуту
- в) 15-16 в минуту
- г) 10-12 в минуту

210. Причина легко возникающих срыгиваний у грудных детей:

- а) малый объем желудка
- б) низкая кислотность желудочного сока
- в) короткий пищевод
- г) слабость кардиального сфинктера желудка

211. Среднесуточный диурез годовалого ребенка:

- а) 200 мл
- б) 400 мл
- в) 600 мл
- г) 800 мл

212. Частота мочеиспусканий в сутки у детей 2-3 лет:

- а) 12-15
- б) 8-10
- в) 15-20
- г) 5-6

213. Условный рефлекс на мочеиспускание у ребенка начинает вырабатываться в возрасте:

- а) 3 месяца

- б) 6 месяцев
- в) 9 месяцев
- г) 12 месяцев

214. Врожденный гипотиреоз развивается в результате дефицита:

- а) железа
- б) меди
- в) йода
- г) кальция

215. Продолжительность периода новорожденности составляет:

- а) 3 недели
- б) 4 недели
- в) 5 недель
- г) 6 недель

216. Ранний неонатальный период – это:

- а) первые 7 суток жизни новорожденного
- б) первые 10 суток жизни новорожденного
- в) первые 14 суток жизни новорожденного
- г) первый месяц жизни новорожденного

217. донором крови может быть лицо

- 1) достигшее возраста 18 лет или приобретшее полную дееспособность до достижения им возраста 18 лет
- 2) от 18 до 60 лет, не имеющее медицинских противопоказаний
- 3) от 16 до 50 лет, не имеющее медицинских противопоказаний
- 4) от 18 до 55 лет, не имеющее медицинских противопоказаний

218. Здоровый новорожденный оценивается по шкале Апгар на:

- а) 1-3 балла
- б) 4-5 баллов
- в) 6-7 баллов
- г) 8-10 баллов

219. Начинать прогулки с новорожденным следует начинать при температуре воздуха на улице не ниже:

- а) -5° С
- б) -10° С
- в) -15° С
- г) -20° С

220. Для опрелостей 3-й степени характерно:

- а) гиперемия кожи

- б) сыпь на коже
- в) шелушение кожи
- г) эрозии и мокнутие

221. Понятие «утренний туалет» новорожденного включает в себя:

- а) туалет глаз, ушей, носовых ходов
- б) взвешивание
- в) купание
- г) пеленание

222. Трудно поддающиеся лечению опрелости у грудного ребенка могут быть симптомом:

- а) инфекционного заболевания
- б) рахита
- в) анемии
- г) аллергического диатеза

223. Гестационный возраст доношенного ребенка:

- а) 32-34 недель
- б) 35-37 недель
- в) 38-42 недели
- г) 44-46 недель

224. Переношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности:

- а) 38 недель
- б) 40 недель
- в) более 42 недель
- г) 39 недель

225. мораль - это классифицированные культурой по критерию «добро-зло»

- 1) отношения и нравы людей
- 2) совокупность научных фактов
- 3) философское учение
- 4) соблюдение законов и Конституции

226. Здорового новорожденного следует прикладывать к груди:

- а) в первые 30 минут после рождения
- б) через 3 часа после рождения
- в) через 12 часов после рождения
- г) через 24 часа после рождения

227. Аэрофагия – это:

- а) отрыжка воздухом
- б) заглатывание воздуха во время приема пищи

- в) вздутие кишечника
- г) отхождение газов

228. При аэрофагии ребенка грудного возраста необходимо:

- а) выложить на живот
- б) положить на правый бок
- в) положить на кровать с возвышенным головным концом
- г) поддержать после кормления в вертикальном положении для отрыгивания воздуха

229. Лактационный криз – это:

- а) полное отсутствие молока в груди
- б) временное снижение лактации в течение 5-7 дней
- в) самопроизвольное истечение молока из груди
- г) затруднение выделения молока из груди

230. донором является

- 1) лицо, прошедшее медицинское обследование и добровольно сдающее кровь или ее компоненты
- 2) медицинский работник, осуществляющий заготовку крови
- 3) врач клинического отделения, прошедший обучение по вопросам трансфузиологии
- 4) физическое лицо, которому проведено переливание донорской крови или ее компонентов

231. В кашу грудного ребенка следует добавлять сливочного масла:

- а) 1-2 г
- б) 3-5 г
- в) 7-10 г
- г) 10-15 г

232. При смешанном вскармливании недостаток грудного молока восполняется:

- а) молочной смесью
- б) творогом
- в) кашей
- г) овощным пюре

233. Адаптированные молочные смеси:

- а) изготавливаются из донорского женского молока
- б) изготавливаются из коровьего молока, приближенного по составу к женскому
- в) изготавливаются путем обогащения коровьего молока витаминами
- г) синтезируются искусственным путем

234. Средние показатели массы и длины тела в возрасте 12 месяцев:
- а) 8 кг, 60 см
 - б) 9 кг, 70 см
 - в) 10 кг, 75 см
 - г) 12 кг, 80 см
235. Доношенный ребенок на первом году жизни вырастает в среднем на:
- а) 10 см
 - б) 15 см
 - в) 20 см
 - г) 25 см
236. Ребенок непродолжительно удерживает голову лежа на животе в возрасте:
- а) 2 месяца
 - б) 3 месяца
 - в) 4 месяца
 - г) 5 месяцев
237. Ребенок должен хорошо ползать в возрасте:
- а) 6 месяцев
 - б) 7 месяцев
 - в) 8 месяцев
 - г) 9 месяцев
238. Ребенок произносит 8-10 простых слов в возрасте:
- а) 10 месяцев
 - б) 12 месяцев
 - в) 14 месяцев
 - г) 16 месяцев
239. Согласно ОСТу 42-21-2-85, стерилизации должны подвергаться изделия:
- а) соприкасающиеся с раневой поверхностью
 - б) контактирующие с кровью
 - в) соприкасающиеся со слизистой оболочкой с возможным ее повреждением
 - г) все ответы верны
240. Вакцины и анатоксины предназначены для:
- а) создания пассивного иммунитета к инфекционным заболеваниям
 - б) создания активного иммунитета к инфекционным заболеваниям
 - в) серологической диагностики
 - г) лечения инфекционных заболеваний
241. Вакцина БЦЖ вводится:
- а) накожно

- б) внутрикожно
- в) подкожно
- г) внутримышечно

242. Реакция Манту проводится с целью:

- а) диагностики туберкулеза
- б) лечения туберкулеза
- в) создания иммунитета против туберкулеза
- г) экстренной профилактики туберкулеза

243. Система, обеспечивающая сохранность активности вакцинных препаратов на всех этапах хранения и транспортировки от предприятия-изготовителя до вакцинируемого:

- а) холодовая цепь
- б) тепловая цепь
- в) температурная цепь
- г) транспортная цепь

244. Профилактические прививки детям, впервые поступающим в ясли-сад:

- а) противопоказаны
- б) проводятся не позднее чем за 1 месяц до поступления
- в) могут проводиться непосредственно перед поступлением
- г) проводятся не позднее, чем за 2 недели до поступления

245. Метод плантографии позволяет выявить:

- а) нарушение осанки
- б) сколиоз
- в) плоскостопие
- г) деформацию грудной клетки

246. Бледность, "гусиная кожа", озноб, мышечная дрожь, отсутствие потоотделения характерны для:

- а) критического снижения температуры тела
- б) литического снижения температуры тела
- в) для стадии подъема температуры тела
- г) для стадии стояния температуры тела на высоких цифрах

247. Зависимое сестринское вмешательство при острых лихорадочных состояниях:

- а) смена нательного и постельного белья
- б) обильное питье
- в) физические методы охлаждения
- г) введение жаропонижающих средств

248. Метод оценки функции внешнего дыхания, позволяющий измерить пиковую скорость выдоха:

- а) спирометрия
- б) пикфлоуметрия
- в) динамометрия
- г) пневмотахиметрия

249. если возбуждение и беспокойное поведение пациента сопровождаются стонами и гримасами, то это истолковывают как свидетельство

- А) физической боли
- Б) признаков депрессии
- В) постепенного угасания сознания
- Г) душевной боли

250. Стерильная посуда необходима при сборе кала на:

- а) на скрытую кровь
- б) копрологию
- в) дисбактериоз
- г) яйца глистов

251. Оценить функцию почек позволяет проба:

- а) Амбурже
- б) Зимницкого
- в) Аддиса-Каковского
- г) Нечипоренко

252. На пробу по Нечипоренко моча собирается:

- а) за 3 часа
- б) за 12 часов
- в) утренняя, средняя порция
- г) за 24 часа

253. Суточное количество выпиваемой жидкости при остром пиелонефрите должно:

- а) соответствовать физиологическим потребностям
- б) превышать физиологическую потребность в 1,5-2 раза
- в) превышать физиологическую потребность в 3-4 раза
- г) быть меньше физиологической потребности

254. Полиурия – это:

- а) увеличение суточного количества мочи
- б) учащенное мочеиспускание
- в) болезненное мочеиспускание
- г) уменьшение суточного количества мочи

255. Десмургия это:

- а) учение о взаимоотношениях
- б) учение о связках
- в) учение о мышцах
- г) учение о повязках
- д) учение о лечении переломов вытяжением

256. Какая повязка считается лечебной:

- а) уздечка (повязка на голову)
- б) колосовидная
- в) черепашья
- г) мазевая
- д) возвращающаяся

257. При переломе костей предплечья шина накладывается:

- а) от кончиков пальцев до верхней трети плеча
- б) от основания пальцев до верхней трети плеча
- в) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча
- г) от кончиков пальцев до нижней трети плеча
- д) от лучезапястного сустава до нижней трети плеча

258. При открытых переломах транспортная иммобилизация:

- а) не проводится
- б) проводится в первую очередь
- в) проводится после остановки кровотечения
- г) проводится после остановки кровотечения и наложения повязки на рану
- д) проводится после измерения артериального давления

259. Какой вид повязок не относится к мягким?

- а) защитная
- б) лекарственная
- в) иммобилизирующая
- г) давящая
- д) окклюзионная

260. Средний бинт имеет ширину:

- а) 5-7 см
- б) 7- 10 см
- в) 5 - 10 см
- г) 8 - 10 см

261. Трубочатый бинт № 2 накладывается на:

- а) голову
- б) мизинец
- в) кисть

- г) плечо
- д) предплечье

262. Трубчатый бинт № 5 накладывается на:

- а) голову
- б) грудную клетку
- в) голень
- г) плечо
- д) кисть

263. слова «инкурабельный пациент» переводятся как

- А) неизлечимый пациент
- Б) страдающий пациент
- В) умирающий пациент
- Г) онкологический пациент

264. Черепашью повязку накладывают на:

- а) плюсне-фаланговый сустав
- б) локтевой сустав
- в) на область крестца
- г) тазобедренный сустав

265. Что такое суточный диурез:

- а) общее количество мочи, выделяемой человеком в течение суток
- б) общее количество мочи, выделяемое человеком в дневное время
- в) общее количество мочи, выделяемое человеком в ночное время

266. Суточный диурез составляет от выпитой жидкости:

- а) 50 %
- б) 75 %
- в) 85 %
- г) 90 %

267. Дизурическое расстройство объединяет:

- а) болезненные, учащенные и затрудненные мочеиспускания
- б) учащенные и затрудненные мочеиспускания
- в) болезненные и затрудненные мочеиспускания

268. Дневной диурез от суточного количества мочи составляет:

- а) 1/2 часть
- б) 2/3 части
- в) 1/3 части
- г) 2/5 части

269. При туберкулезе легких назначается диета:

- а) щадящая диета
- б) основной вариант стандартной диеты
- в) с пониженным количеством белка
- г) с повышенным количеством белка

270. Для сбора мочи по Зимницкому необходимо все, кроме:

- а) чистая посуда
- б) обычный водный режим
- в) ограничить прием жидкости
- г) сбор мочи поводить в течение суток

271. Низкое потребление поваренной соли в сутки составляет:

- а) 1-3 г
- б) 2-4 г
- в) 3-5 г
- г) 2-5 г
- д) 4-7 г

272. За конечное значение АД принимается:

- а) среднее из двух последних измерений
- б) максимальные цифры АД, полученные при измерении давления
- в) минимальные цифры АД, полученные при измерении давления

273. Положение больного при измерении давления:

- а) сидя в удобной позе, рука опущена
- б) сидя в удобной позе, рука на столе
- в) стоя в удобной позе, рука на столе

274. Нижний край манжетки, при измерении АД, должен располагаться выше локтевого сгиба на:

- а) 1 см
- б) 2 см
- в) 3 см

275. Индекс массы тела в норме:

- а) 18,5 – 24,9
- б) 18 – 22
- в) 20-26
- г) 18,5-24

276. При ожирении индекс массы тела:

- а) выше 30
- б) выше 30,1
- в) выше 30,5
- г) выше 29,9

277. этическим долгом медицинских работников в области паллиативной медицины является

- А) удовлетворение психических, социальных и духовных потребностей пациента
- Б) обязательное выполнение всех пожеланий родных и близких больного
- В) облегчение страданий родственников
- Г) выполнение любых пожеланий пациента

278. лицам пожилого и старческого возраста лекарственные препараты

- А) назначаются в уменьшенной дозе
- Б) назначаются в увеличенной дозе
- В) назначаются в большом количестве
- Г) предлагается запивать молоком

279. к долгожителям относятся люди в возрасте

- 1) старше 90 лет
- 2) 75-90 лет
- 3) старше 80 лет
- 4) старше 100 лет

280. Появление пульса на сонной артерии во время непрямого массажа сердца - свидетельство:

- а) эффективности реанимации
- б) оживления больного
- в) правильности проведения массажа сердца
- г) восстановления сердечной деятельности
- д) восстановления сердечной деятельности и прекращении массажа сердца

281. Признаками эффективной реанимации являются:

- а) пульсация сонной артерии во время массажа сердца
- б) движения грудной клетки во время ИВЛ
- в) сужение зрачков и уменьшение цианоза
- г) расширение зрачков

282. Введение воздуховода:

- а) позволяет осуществить туалет полости рта
- б) предупреждает аспирацию содержимого ротоглотки
- в) восстанавливает проходимость дыхательных путей на уровне гортани и трахеи
- г) предупреждает прикусывание языка
- д) устраняет западение языка

283. Для острой кровопотери характерно все, кроме:

- а) бледность кожных покровов

- б) холодный пот
- в) головокружение
- г) частый пульс
- д) подъем АД

284. Метки тока – это:

- а) овальные пятна от 2 до 5 см в диаметре, светлые внутри, синеватые по периферии
- б) округлые пятна от 1 до 6 см в диаметре, темные внутри, красные по периферии
- в) округлые пятна от 1 до 6 см в диаметре, темные внутри, синеватые по периферии
- г) овальные пятна от 2 до 5 см в диаметре, светлые внутри, красные по периферии

285. Режим стерилизации в автоклавах:

- а) 2 атм, 132⁰, 20 минут
- б) 1,1 атм, 132⁰, 20 минут
- в) 2 атм, 132⁰, 15 минут
- г) 1,1 атм, 120⁰, 20 минут
- д) 1,1 атм, 120⁰, 30 минут

286. Режимы работы сухожирового шкафа:

- а) 180⁰ – 40 минут
- б) 180⁰ – 60 минут
- в) 180⁰ – 50 минут
- г) 180⁰ – 120 минут
- д) 180⁰ – 90 минут

287. Инструменты замачивают в моющем растворе на стадии предстерилизационной обработки на:

- а) 30 минут
- б) 20 минут
- в) 25 минут
- г) 15 минут
- д) 10 минут

288. К механической антисептике относится:

- а) применение 1% раствора бриллиантового зеленого
- б) применение 96% этилового спирта
- в) первичная хирургическая обработка ран
- г) применение бактериофагов
- д) применение гипертонического раствора

289. Азопирамовая проба применяется для:

- а) оценки качества очистки шприцев и медицинского инструментария
- б) оценки качества санитарной обработки больных
- в) оценки качества обработки посуды в пищеблоке
- г) перед введением антибиотиков

290. наблюдение за пострадавшим после оказания первой помощи проводится

- А) до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи
- Б) до прибытия бригады скорой медицинской помощи
- В) до улучшения его самочувствия
- Г) в течение первого часа

291. На какую глубину вводят желудочный зонд при промывании желудка?

- а) на глубину 25 см;
- б) на глубину, равную расстоянию от кончика носа до пупка пациента
- в) на глубину 40 см;
- г) на максимально возможную глубину;
- д) на глубину 60 см

292. Как долго (сколько раз) необходимо повторять процедуру промывания желудка сифонным методом?

- а) 3 раза
- б) до окончания приготовленной для процедуры воды;
- в) до чистой воды;
- г) 10 раз;
- д) 5 раз

293. На какую глубину вводится газоотводная трубка в прямую кишку?

- а) 10-15 см
- б) 20-30 см
- в) 35-40 см
- г) 40-50 см
- д) вводится до начала отхождения газов
- д) до прекращения отхождения газов

294. Что относится к понятию «лечебная клизма»?

- а) сифонная
- б) очистительная
- в) лекарственная
- г) послабляющая
- д) все перечисленные

295. Для постановки масляной клизмы необходимо все перечисленное, кроме:

- а) судна

- б) грушевидного баллона или шприца Жане
- в) клеенки
- г) газоотводной трубки и вазелина
- д) кружки Эсмарха и наконечника

296. Для постановки гипертонической клизмы используются все перечисленные растворы, кроме:

- а) 10 % раствора натрия хлорида
- б) 40 % раствора глюкозы
- в) 20 % раствора магния сульфата
- г) 30 % раствора магния сульфата

297. Укажите правильное положение больного при проведении дуоденального зондирования:

- а) больной на левом боку, под таз подложен мягкий валик или подушка, а под левом подреберье – теплая грелка
- б) больной на спине, на область правого подреберья – теплая грелка
- в) больной на правом боку, под таз подложен мягкий валик или подушка, а под правом подреберье – теплая грелка
- г) больной на правом боку, под таз подложен мягкий валик или подушка
- д) больной на левом боку, под таз подложен мягкий валик или подушка, а на область правого подреберья – теплая грелка

298. Сифонная клизма применяется:

- а) при кишечном кровотечении
- б) для ректального введения лекарств
- в) при невозможности питания больного через рот
- г) при желудочном кровотечении
- д) для удаления кишечного содержимого

299. Более эффективным при отравлениях является:

- а) беззондовое промывание желудка
- б) внутрижелудочное введение кислорода
- в) использование грелки на область живота
- г) зондовое промывание желудка

300. Пикфлоуметр – это:

- а) прибор, позволяющий измерить объем проходимого воздуха при выдохе в единицу времени
- б) прибор, позволяющий определить состав проходимого воздуха при выдохе в единицу времени
- в) прибор, позволяющий измерить объем проходимого воздуха при выдохе за час
- г) прибор, позволяющий измерить оксид азота выдыхаемого воздуха при выдохе в единицу времени

301. Выдох при пикфлоуметрии производится:

- а) медленно и резко
- б) быстро и резко
- в) медленно и спокойно

302. Бронхолабильность – это:

- а) разница между двумя любыми показателями пикфлоуметрии
- б) разница между наименьшей и наибольшей величинами пикфлоуметрии
- в) разница между наибольшей и наименьшей величинами пикфлоуметрии

303. В зеленой зоне показатель пиковой скорости выдоха составляет:

- а) 80 - 100%
- б) 60 - 80%
- в) 60 - 90%
- г) 50 - 80%
- д) 40 – 80%

304. Ирригоскопия – это:

- а) контрастное исследование тонкого кишечника
- б) эндоскопическое исследование прямой кишки и сигмы
- в) рентгеноконтрастное исследование толстого кишечника
- г) рентгеноконтрастное исследование желчного пузыря

305. Преимущества спейсера:

- а) лекарство оседает все в ротовой полости
- б) лекарство значительно глубже проникает в дыхательные пути
- в) перед ингаляцией не надо встряхивать баллончик с препаратом
- г) можно разговаривать во время ингаляции

306. Ошибки использования дозирующего ингалятора:

- а) глубокий вдох
- б) сразу делают выдох через нос
- в) после ингаляции прополоскать рот кипяченой водой
- г) перед ингаляцией надо встряхивать баллончик с препаратом в течение 10-20 секунд

307. Тахипноэ – это:

- а) учащенное дыхание
- б) уреженное дыхание
- в) остановка дыхания

308. Как проводится сбор мокроты для общего анализа

- а) в любое время суток
- б) утром натощак, до курения

- в) утром после завтрака, но нельзя курить
- г) утром, через 10 минут после курения

309. Растворы для наружного применения имеют этикетку:

- а) красную
- б) зеленую
- в) синюю
- г) оранжевую

310. Постовая медицинская сестра выписывает лекарственные препараты:

- а) 1 раз в 2-3 дня
- б) по мере необходимости лекарственных препаратов
- в) ежедневно
- г) 1 раз в неделю

311. Запас лекарственных средств в отделении не должен превышать:

- а) 30 дней
- б) 20 дней
- в) 10 дней
- г) 40 дней

312. Прием плановых препаратов больной осуществляет в присутствии:

- а) старшей медицинской сестры
- б) постовой медицинской сестры
- в) процедурной медицинской сестры
- г) врача

313. Какую повязку следует наложить при переломе с целью оказания первой помощи:

- а) ползучую
- б) иммобилизирующую
- в) круговую
- г) гипсовую
- д) колосовидную

314. Какая повязка накладывается при проникающем ранении грудной клетки:

- а) круговая
- б) спиральная
- в) окклюзионная
- г) иммобилизирующая
- д) черепашья

315. вызов скорой медицинской помощи и других экстренных служб к месту происшествия производится

- А) после определения состояний, представляющих угрозу жизни пострадавших
- Б) немедленно после прибытия на место происшествия
- В) в случае неэффективности мероприятий первой помощи
- Г) при выявлении пострадавших в значительном количестве

316. Что следует предпринять при открытом переломе бедра и повреждении артерии:

- а) наложить повязку
- б) наложить жгут
- в) произвести иммобилизацию конечности
- г) срочно госпитализировать
- д) измерить артериальное давление

317. Выберите правильное направление наложения повязки

- а) от периферии конечности по направлению к туловищу
- б) от туловища к периферии конечности
- в) не имеет значения

318. Узкий бинт имеет ширину до:

- а) 3 см
- б) 4 см
- в) 5 см
- г) 6 см

319. Трубчатый бинт № 1 накладывается на:

- а) голову
- б) мизинец
- в) голень
- г) плечо
- д) кисть

320. Трубчатый бинт № 4 накладывается на:

- а) плечо
- б) мизинец
- в) голень
- г) бедро
- д) кисть

321. шок при множественных переломах

- А) травматический
- Б) кардиогенный
- В) анафилактический
- Г) гемотрансфузионный

322. Крестообразную повязку накладывают на:

- а) голень
- б) плечо
- в) заднюю поверхность шеи
- г) грудную клетку
- д) бедро

323. Подготовка больного к рентгенологическому исследованию мочевыделительной системы (урографии) включает:

- а) определение диуреза
- б) очистительную клизму
- в) назначение мочегонных
- г) подсчет числа мочеиспусканий в сутки

324. На общий анализ мочи отправляют:

- а) среднюю порцию утренней мочи
- б) всю утреннюю порцию мочи
- в) 150-200 мл из суточной мочи

325. Поллакиурия:

- а) затруднение мочеиспускания
- б) учащенное мочеиспускание
- в) острая задержка мочи
- г) болезненные мочеиспускания

326. Сколько % суточной мочи выделяется в дневные часы в норме

- а) 40—50 %
- б) 50—70 %
- в) 60—80 %
- г) 60—90 %
- д) 70—90 %

327. При лихорадочных состояниях назначается диета:

- а) диета с механическим и химическим щажением
- б) основной вариант стандартной диеты
- в) с пониженным количеством белка
- г) с повышенным количеством белка

328. Моча на диастазу собирается:

- а) свежесобранная моча в количестве не менее 50 мл
- б) свежесобранная моча в количестве 100 мл
- в) утренняя моча в количестве не менее 50 мл
- г) утренняя моча в количестве 100 мл

329. причина развития терминального состояния

- А) кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови
- Б) хроническое заболевание желудка
- В) компенсированный сахарный диабет
- Г) стадия реконвалесценции вирусного гепатита В

330. больным с бронхиальной астмой необходима консультация

- 1) врача-аллерголога
- 2) врача-инфекциониста
- 3) врача-онколога
- 4) врача-хирурга

331. Манжетка накачивается до уровня:

- а) на 40 мм рт. ст. выше после исчезновения пульса
- б) на 20 мм рт. ст. выше после исчезновения пульса
- в) на 30 мм рт. ст. выше после исчезновения пульса
- г) на 10 мм рт. ст. выше после исчезновения пульса

332. До измерения АД нельзя курить в течение:

- а) 10 минут
- б) 20 минут
- в) 15 минут
- г) 30 минут

333. профилактика сердечно-сосудистых заболеваний заключается в

- 1) соблюдении режима физической активности, диеты, здорового образа жизни
- 2) физиотерапевтических методах лечения
- 3) механических методах лечения, физкультурой в занятиях лечебной
- 4) медикаментозной терапии

334. Индекс массы тела рассчитывается:

- а) масса тела (в кг) разделить на рост в квадрате (в сантиметрах)
- б) масса тела (в кг) разделить на рост (в метрах)
- в) масса тела (в кг) разделить на рост в квадрате (в метрах)
- г) масса тела (в кг) разделить на рост (в сантиметрах)

335. Избыточной массе тела соответствуют показатели индекса массы тела:

- а) 24-30
- б) 25-30
- в) 25-29,9
- г) 24,5-29,9

336. «состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов» по определению Всемирной организации здравоохранения - это

- 1) здоровье
- 2) диспансеризация
- 3) профилактика
- 4) политика

337. Реанимация это:

- а) раздел медицины, изучающий терминальные состояния
- б) отделение многопрофильной больницы
- в) практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности организма
- г) проведение непрямого массажа сердца
- д) проведение искусственной вентиляции легких

338. Движения грудной клетки во время искусственной вентиляции легких - свидетельство:

- а) эффективности реанимации
- б) правильности проводимой ИВЛ
- в) оживлении больного
- г) восстановлении дыхания
- д) восстановлении дыхания и прекращении ИВЛ

339. Выдвижение нижней челюсти:

- а) устраняет западение языка
- б) позволяет осуществить туалет полости рта
- в) восстанавливает проходимость дыхательных путей на уровне гортани и трахеи
- г) предупреждает прикусывание языка

340. Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях составляет:

- а) 1 – 2 минуты
- б) 2 – 3 минуты
- в) 5 – 6 минут
- г) до 10 минут
- д) до 15 минут

341. Для венозного кровотечения характерно все, кроме:

- а) кровь темная
- б) обильное выделение крови
- в) кровь идет пульсирующей струей

342. Транспортировка больного при ранении артерии головы и шеи производится:

- а) с опущенным головным концом
- б) с приподнятым головным концом
- в) с опущенным ножным концом
- г) с приподнятым ножным концом
- д) на боку

343. Все входящие в операционную должны быть:

- а) в стерильной одежде
- б) в бахилах
- в) в чистой одежде
- г) в стерильной одежде, бахилах и маске
- д) не имеет значения

344. Режим стерилизации в автоклавах:

- а) 2 атм, 132⁰, 50 минут
- б) 1,1 атм, 132⁰, 20 минут
- в) 1,1 атм, 120⁰, 45 минут
- г) 2 атм, 120⁰, 20 минут
- д) 1,1 атм, 120⁰, 30 минут

345. иммунопрофилактика инфекционных заболеваний направлена на

- 1) здоровое население, имеющее риск инфицирования
- 2) пути передачи возбудителей
- 3) источник инфекции
- 4) возбудителей заболевания

346. Каким путем не вводится зонд при проведении искусственного питания?

- а) через нос
- б) через рот
- в) через гастростому
- г) через прямую кишку
- д) все ответы правильные

347. Если во время введения толстого желудочного зонда появляется кашель, то:

- а) зонд продолжают продвигать глубже;
- б) зонд извлекают;
- в) больного просят сделать глубокий вдох;
- г) подают в зонд кислородную смесь;
- д) больного просят задержать дыхание

348. специфическая профилактика туберкулеза предполагает проведение

- 1) вакцинации и ревакцинации

- 2) пробы Манту
- 3) Диаскин-теста
- 4) рентгенографии

349. Что не является показанием к проведению очистительной клизмы?

- а) подготовка больного к рентгенологическому исследованию органов ЖКТ
- б) первые дни после операции на органах пищеварительного тракта
- в) запоры
- г) отравления
- д) перед постановкой лекарственной клизмы

350. За сколько времени пациент должен принять рентгеноконтрастный препарат при холецистографии?

- а) за 12-14 часов
- б) за 24 часа
- в) за 3-4 часа
- г) за 48 часов
- д) непосредственно перед исследованием

351. При исследовании кала на скрытую кровь из диеты не исключаются:

- а) отварной картофель
- б) мясо
- в) рыба
- г) томаты
- д) гречневая каша

352. Для определения нормы пиковой скорости выдоха необходимо знать:

- а) рост, вес
- б) возраст, вес
- в) возраст, рост, пол
- г) возраст, тяжесть бронхиальной астмы

353. Ошибки использования дозирующего ингалятора:

- а) недостаточно глубокий вдох
- б) глубокий вдох
- в) задерживают дыхание на 10 секунд после синхронизированного нажатия ингалятора
- г) перед ингаляцией надо встряхивать баллончик с препаратом в течение 10-20 секунд

354. Апноэ – это:

- а) учащенное дыхание
- б) уреженное дыхание
- в) остановка дыхания

355. список пациентов, находящихся на лечении в отделении (подразделении) медицинской организации для справочного стола составляется

- 1) ежедневно медицинской сестрой ночной смены
- 2) старшей медицинской сестрой
- 3) заведующим отделением
- 4) процедурной медицинской сестрой

356. Раздачу лекарственных препаратов осуществляет:

- а) старшая медицинская сестра
- б) постовая медицинская сестра
- в) процедурная медицинская сестра
- г) врач

357. Лекарственные препараты запивают:

- а) кипяченой водой
- б) молоком
- в) морсом
- г) сладким чаем

358. Наркотические лекарственные препараты вводятся:

- а) в присутствии старшей медицинской сестры
- б) постовая медицинская сестра самостоятельно
- в) процедурной медицинской сестрой в присутствии постовой медицинской сестры
- г) в присутствии врача

359. Растворы для внутреннего применения имеют этикетку:

- а) красную
- б) зеленую
- в) синюю
- г) желтого

360. Растворы для инъекций и инфузий имеют этикетку:

- а) красную
- б) зеленую
- в) синюю
- г) желтого

361. Основоположницей системы ухода за пациентами является:

- а) Юлия Вревская
- б) Флоренс Найтингейл
- в) Екатерина Бакунина
- г) Дарья Севастопольская

362. К областям деятельности сестринского персонала относится все перечисленное, за исключением одного:

- а) укрепление здоровья
- б) диагностика заболеваний
- в) профилактика болезней и травм
- г) облегчение страданий

363. Основные понятия сестринского дела это все, кроме:

- а) сестра
- б) пациент
- в) окружающая среда
- г) болезнь

364. Специализированное учреждение для оказания лечебно-профилактической помощи группам пациентов определенного профиля:

- а) поликлиника
- б) диспансер
- в) медсанчасть
- г) станция скорой помощи

365. Потенциальная физиологическая проблема пациента:

- а) нарушение сна
- б) недержание мочи
- в) риск появления пролежней
- г) риск суицидальной попытки

366. Реакция пациента на болезнь может быть:

- а) физиологической
- б) психологической
- в) социальной
- г) все выше перечисленные

367. Сестринский диагноз:

- а) не меняется
- б) меняется 1 раз
- в) меняется 2 раза
- г) меняется неоднократно

368. Основным компонентом цели является:

- а) действие
- б) время
- в) условие
- г) всё выше перечисленное

369. Действие медсестры, неспособное разрешить проблемы пациента без консультации и сотрудничества с врачом:

- а) независимое сестринское вмешательство
- б) зависимое сестринское вмешательство
- в) взаимозависимое сестринское вмешательство
- г) любое сестринское вмешательство

370. Действие медсестры, способное разрешить проблемы пациента без консультации и сотрудничества с врачом:

- а) независимое сестринское вмешательство
- б) зависимое сестринское вмешательство
- в) взаимозависимое сестринское вмешательство
- г) любое сестринское вмешательство

371. Задачей медсестры является:

- а) постановка медицинского диагноза
- б) выявление причины нарушения функций органов и систем
- в) обеспечение мотивированного индивидуального ухода
- г) лечение заболевания

372. К факторам риска падений пациентов относится все перечисленное, за исключением:

- а) нарушение равновесия
- б) переохлаждение
- в) возраст старше 65 лет
- г) нарушение зрения

373. Этапы сестринского процесса документируются медсестрой в:

- а) медицинскую историю болезни
- б) сестринскую историю болезни
- в) историю развития
- г) не регистрируются

374. за подделку медицинских документов законодательством российской федерации

предусматривается

- 1) уголовная ответственность
- 2) выговор
- 3) строгий выговор
- 4) наказание не предусматривается

375. Согласно международной договоренности основными понятиями философии сестринского дела являются все, кроме:

- а) здоровье
- б) диагностика и лечение

- в) сестринское дело
- г) окружающая среда и общество

376. интервал между сбором мочи и доставкой в лабораторию должен быть не более

- А) 2 часа
- Б) 8 часов
- В) 4 часа
- Г) 1 часа

377. Совокупность норм поведения медика и их регулирование в лечебном процессе – это:

- а) медицинская этика
- б) сестринский процесс
- в) сестринское дело
- г) культура поведения

378. Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры оказывать в меру своей компетентности неотложную медицинскую помощь:

- а) только умирающим
- б) только по назначению врача
- в) только в условиях стационара
- г) любому человеку, нуждающемуся в ней

379. При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким пациентам медсестра руководствуется:

- а) возрастом и полом
- б) медицинскими показаниями
- в) социальным статусом
- г) личным отношением

380. Медсестра вправе раскрыть конфиденциальную информацию о пациенте только:

- а) с согласия пациента
- б) по своим убеждениям
- в) по просьбе родственников
- г) по разрешению лечащего врача

381. Основная цель сестринского процесса:

- а) оценка качества ухода
- б) обследование больного
- в) диагностика и лечение заболевания
- г) достижение гармоничности состояния пациента с миром и самим собой

382. При определении целей для каждой проблемы не следует учитывать:

- а) отношение пациента к медсестре
- б) пожелания пациента
- в) возможности сестры и ресурсы
- г) профессиональный опыт

383. Функцией медсестры является всё перечисленное, кроме:

- а) осуществление сестринского ухода
- б) обучение пациентов и сестринского персонала
- в) развитие сестринской практики с помощью исследовательской деятельности
- г) лечение заболевания

384. Генеральную уборку операционного блока и перевязочных проводят:

- а) 2 раза в месяц
- б) 1 раз в месяц
- в) 1 раз в неделю
- г) 1 раз в день

385. сведения о пациентах, состоящих на питании на 9 часов утра, подаются диетической сестре пищеблока

- А) старшими медицинскими сестрами отделений
- Б) палатными сестрами отделений
- В) заведующим отделением
- Г) главной медсестрой

386. Количество классов отходов ЛПУ по опасности заражения:

- а) 3
- б) 4
- в) 5
- г) 8

387. Для сбора отходов класса Б используют одноразовую упаковку:

- а) черного цвета
- б) голубого цвета
- в) красного цвета
- г) белого цвета
- д) желтого цвета

388. Для сбора отходов класса В используют одноразовую упаковку:

- а) голубого цвета
- б) красного цвета
- в) желтого цвета
- г) черного цвета
- д) белого цвета

389. смешивание отходов различных классов в общей емкости

- 1) недопустимо
- 2) допустимо
- 3) зависит от класса отходов
- 4) допустимо при дефиците одноразовых пакетов

390. К отходам класса Г относятся

- а) инфицированные и потенциально инфицированные отходы
- б) ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование.
- в) патологоанатомические отходы
- г) радиоактивные отходы

391. противопедикулезные мероприятия в медицинской организации проводят

- 1) медицинский персонал
- 2) сам пациент
- 3) врач приемного отделения
- 4) родственники пациента

392. Клизменные наконечники сразу же после использования подлежат:

- а) протиранию салфеткой
- б) стерилизации
- в) дезинфекции
- г) ополаскиванию под проточной водой

393. Длительность использования накрытого стерильного стола

- а) 24 часа
- б) 18 часов
- в) 12 часов
- г) 6 часов

394. Длительность сохранения стерильности мед. инструментария в мягкой бязевой упаковке и в условиях стерильности:

- а) 1 сутки
- б) 2 суток
- в) 3 суток
- г) 20 суток

395. положением Фаулера называется

- А) лежа на спине с приподнятым изголовьем на 45-60°
- Б) лежа на спине
- В) лежа на боку
- Г) лежа на животе

396. Положение Симса:

- а) промежуточное между положением лежа на боку и лежа на животе
- б) лежа на спине
- в) лежа на животе
- г) полулежа и полусидя

397. Какие возбудители наиболее часто вызывают ВБИ?

- а) условно-патогенные микробы
- б) вирус иммунодефицита человека
- в) вирусы парентеральных гепатитов
- г) сальмонеллы

398. Какой уровень обработки рук медсестры применяется перед инъекциями?

- а) профилактический
- б) гигиенический
- в) хирургический
- г) обработка рук не проводится

399. Какой уровень обработки рук медсестры применяется перед операцией?

- а) профилактический
- б) гигиенический
- в) хирургический
- г) обработка рук не проводится

400. Какой вид дезинфекции ежедневно применяется в ЛПУ любого профиля?

- а) профилактическая
- б) очаговая
- в) текущая
- г) заключительная

401. признаки полной обструкции дыхательных путей вследствие попадания инородного тела

- А) невозможность говорить, кашлять, дышать
- Б) жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях
- В) шумное дыхание, кашель
- Г) надрывной кашель, попытка говорить

402. поведение пострадавшего с частичной непроходимостью дыхательных путей, вызванной попаданием инородного тела

- А) хватается за горло, шумно дышит, кашляет, просит о помощи
- Б) не может дышать, кашлять, говорить
- В) внезапная синюшность кожных покровов, потеря сознания, судороги
- Г) хватается за горло, не может говорить, только кивает

403. границы транспортной иммобилизации у пострадавшего при переломе плечевой кости

- А) пальцы кисти на больной стороне - лопатка здоровой стороны
- Б) кисть на больной стороне - лопатка больной стороны
- В) лучезапястный сустав на больной стороне - лопатка больной стороны
- Г) лучезапястный сустав больной стороны - плечевой сустав больной стороны

404. антидот при отравлении метиловым спиртом

- А) этиловый спирт
- Б) гидрокарбонат натрия
- В) перманганат калия
- Г) атропин

405. медицинских работников, отказывающихся от прохождения обязательных периодических медицинских осмотров

- А) не допускают к работе
- Б) штрафуют
- В) увольняют с работы
- Г) направляют на принудительное обследование

406. деонтология – это

- А) совокупность профессиональных правил поведения
- Б) завоевание социального доверия личности
- В) исполнение законодательства
- Г) обязательства перед преподавателями, коллегами, учениками

407. всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять овощи и фрукты в количестве

- 1) 400 г в сутки
- 2) 300 г в сутки
- 3) 250 г в сутки
- 4) 150 г в сутки

408. табакокурение - это фактор риска развития

- 1) онкологических заболеваний
- 2) авитаминоза
- 3) аллергических реакций
- 4) развития ожирения

409. забота о собственном здоровье является

- 1) обязанностью граждан
- 2) добровольным выбором гражданина
- 3) личным делом каждого гражданина
- 4) ответственностью человека перед обществом

410. целью первичной профилактики является

- 1) укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение заболеваний
- 2) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
- 3) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- 4) поддержание качества жизни пациентов

411. ребенок делает первые шаги, говорит около 10 слов, начинает понимать запрет, приучается к навыкам опрятности в возрасте

- 1) 12 месяцев
- 2) 9 месяцев
- 3) 1 год 6 месяцев
- 4) 1 год 9 месяцев

412. к немодифицируемым факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний относится

- 1) наследственная предрасположенность
- 2) курение табака
- 3) нерациональное питание
- 4) гиподинамия

413. к факторам риска развития ишемической болезни сердца у пожилых людей относятся

- 1) сахарный диабет, ожирение
- 2) гипохолестеринемия, гепатоз
- 3) пониженная масса тела, гипотония
- 4) высокий уровень билирубина и ферментов в крови

414. к продуктам, содержащим высокий уровень белка, относятся

- 1) сыр, творог
- 2) овощи и фрукты
- 3) крупы, макароны
- 4) маргарин, майонез

415. мазок из гнойной раны для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам направляется в лабораторию

- 1) бактериологическую
- 2) клиническую
- 3) вирусологическую
- 4) биохимическую

416. обязательное медицинское страхование является

- 1) составной частью государственной системы социального страхования
- 2) системой, направленной на повышение размеров оплаты труда

- 3) страхованием от несчастных случаев
- 4) системой, направленной на защиту прав медицинских работников

417. вывоз и обезвреживание отходов класса Д осуществляется

- 1) организациями по обращению с радиоактивными отходами
- 2) организациями по обращению с бытовыми отходами
- 3) организациями по обращению с токсикологически опасными отходами
- 4) организациями по обращению с промышленными отходами

418. при попадании крови на кожу следует обработать её

- 1) 70% спиртом
- 2) 3% перекисью водорода
- 3) 1% р-ром хлорамина
- 4) 1-2 % р-ром протаргола

419. гигиеническое воспитание - это

- 1) комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность
- 2) просветительная деятельность
- 3) обучающая деятельность
- 4) воспитательная деятельность

420. школы здоровья чаще организуются по

- 1) профилю заболевания
- 2) составу обратившихся
- 3) возрасту
- 4) половому составу

421. оценка физического развития детей проводится с помощью

- 1) центильных таблиц
- 2) индивидуальных стандартов
- 3) возрастных стандартов
- 4) визуально

422. для оценки сознания пострадавшего необходимо

- А) осторожно встряхнуть его за плечи
- Б) похлопать его по щекам
- В) поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом
- Г) надавить на болевые точки

423. цель придания пострадавшему оптимального положения тела при оказании первой помощи

- А) обеспечение комфорта, уменьшение степени страданий
- Б) повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь
- В) обеспечение доступа для наложения повязок
- Г) предупреждение самопроизвольного перемещения тела пострадавшего

424. место пальцевого прижатия при повреждении бедренной артерии

- А) ниже середины паховой складки
- Б) верхняя треть задней поверхности бедра
- В) выше середины паховой складки
- Г) средняя треть внутренней поверхности бедра

425. во время проведения компрессии грудной клетки при сердечно-легочной реанимации взрослому человеку, необходимо надавливать на грудину на глубину

- А) 5-6 см
- Б) 2-3 см
- В) 3-4 см
- Г) 4-5 см

426. оптимальные сроки оказания первой помощи при остановке дыхания и кровообращения

- А) первые 5 минут
- Б) до 15-20 минут
- В) до 12-15 минут
- Г) до 8-10 минут

427. перед оказанием первой помощи необходимо

- А) убедиться в собственной безопасности
- Б) получить разрешение на ее оказание у диспетчера экстренных служб
- В) получить разрешение на ее оказание у пострадавшего
- Г) получить разрешение на ее оказание у родственников пострадавшего

428. шок при острой массивной кровопотере

- А) гиповолемический
- Б) кардиогенный
- В) септический
- Г) гемотрансфузионный

429. реанимационные мероприятия не проводятся при наличии признаков

- А) биологической смерти
- Б) острой почечной недостаточности
- В) острой печеночной недостаточности
- Г) острой массивной кровопотери

430. для определения наличия у пациента дыхания при терминальном состоянии медицинская сестра должна

- А) наклониться ухом к лицу пациента, услышать выдыхаемый воздух или ощутить его щекой и увидеть экскурсию грудной клетки
- Б) провести подсчет дыхательных движений

- В) измерить физиологические показатели кровообращения
- Г) осуществить прием Геймлиха

431. типичная форма инфаркта миокарда

- А) ангинозная
- Б) абдоминальная
- В) астматическая
- Г) безболевая

432. трансфузия - это

- А) переливание крови и ее компонентов
- Б) введение солевых растворов
- В) введение лекарственных средств
- Г) введение антибиотиков

433. первая помощь при тепловом ударе

- А) устранить тепловое воздействие, поместить пострадавшего в тень, смочить лицо прохладной водой
- Б) укрыть влажной простыней
- В) нанести крем на тело
- Г) дать теплое питье

434. прием Геймлиха при инородном теле в гортани - это

- А) серия из 5 толчков кулаком на область верхней половины живота с целью удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
- Б) запрокидывание головы и открывание рта
- В) введение воздуховода
- Г) сочетание искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца

435. цвет кислородных баллонов

- А) голубой
- Б) серый
- В) черный
- Г) белый

436. для клинической смерти не характерно

- А) неадекватное дыхание
- Б) отсутствие самостоятельного дыхания
- В) отсутствие пульса на сонной артерии
- Г) отсутствие сознания

438. возможное осложнение при проведении компрессий грудной клетки

- А) перелом ребер
- Б) перелом ключицы
- В) повреждение трахеи

Г) перелом позвоночника

439. к терминальным состояниям не относится

А) шок

Б) предагония

В) терминальная пауза

Г) клиническая смерть

440. донорская кровь и ее компоненты должны быть

А) биологически полноценны, обладать функциональной активностью и лечебной эффективностью

Б) пройти обеззараживание дезинфицирующими растворами или подвергнуться физическим методам дезинфекции

В) свежезаморожены и приготовлены к использованию

Г) свежезаморожены и перелиты реципиенту

441. компетенция медицинской сестры при обследовании пациента с ожирением

А) измерение массы тела

Б) составление индивидуальной диеты

В) определение степени ожирения

Г) назначение лечения

442. показание к искусственному кормлению через гастростому

А) непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода

Б) бессознательное состояние, переломы челюстей

В) нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса

Г) послеоперационный период

443. проблема пациента в предоперационном периоде

А) страх перед операцией

Б) боль

В) рвота

Г) учащенное мочеиспускание

444. компетенции медицинской сестры при болевом синдроме у послеоперационного пациента

А) создание удобного положения пациента в постели, вызов врача

Б) введение обезболивающего препарата

В) применение ванночки с раствором перманганата калия

Г) измерение температуры

445. независимое вмешательство медицинской сестры в послеоперационном периоде

А) помощь пациентам в самообслуживании

- Б) инъекции антибактериальных препаратов
- В) смена дренажей
- Г) назначение пациенту рациональной диеты

446. абсолютный признак перелома костей

- А) патологическая подвижность костных отломков
- Б) деформация сустава
- В) отечность места повреждения
- Г) боль

447. независимое сестринское вмешательство при недержании мочи у лиц пожилого и старческого возраста

- А) посоветовать применять средства гигиенического ухода (одноразовые впитывающие трусы, урологические прокладки, подгузники)
- Б) посоветовать резкое ограничение жидкости
- В) посоветовать резкое ограничение соли
- Г) провести катетеризацию мочевого пузыря

448. при уходе за гериатрическим пациентом прежде всего необходимо обеспечить

- А) безопасность окружающей среды
- Б) рациональное питание пациента
- В) проведение мероприятий личной гигиены
- Г) сохранение социальных контактов

449. независимое сестринское вмешательство при отеке легких

- А) измерение артериального давления
- Б) придать положение с приподнятым ножным концом
- В) поставить горчичники на грудную клетку
- Г) использование грелок

450. должностные преступления - это

- А) злоупотребление служебным положением, халатность, должностной подлог
- Б) клевета
- В) оскорбление
- Г) оставление в опасности

451. к преступлениям против жизни и здоровья относятся

- А) оставление в опасности
- Б) должностной подлог
- В) халатность
- Г) превышение власти

452. к преступлениям против свободы и достоинства относятся

- А) клевета, оскорбление
- Б) халатность
- В) злоупотребление властью
- Г) должностной подлог

453. физически или психически больной человек, стремясь выздороветь, ожидает от медицинского персонала

- А) помощи, поддержки, внимания
- Б) проведения исследований
- В) лекарственных средств
- Г) осмотра специалистов

454. средства профилактики конфликтных ситуаций

- А) исключение суждений и оценок, ущемляющих честь и достоинство собеседника
- Б) умение слушать
- В) вступление в спор и выяснение ситуации
- Г) применение словесных формул учтивости, настаивание на своем, перебивая собеседника

455. основные правила при общении с агрессивными людьми

- А) не поддаваться чувству гнева, оценить ситуацию, оставаться вежливыми и спокойными
- Б) настаивать на своем решении
- В) отвечать так же агрессивно
- Г) угрожать наказанием

456. если пациент эмоционален, возбужден или затрудняется в формулировке мыслей, важно слушать

- А) молча, доброжелательно, не перебивать замечаниями
- Б) выразить свое неудовольствие
- В) задавать наводящие вопросы
- Г) выяснить причину возбуждения

457. в профессиональной деятельности медсестры наиболее важны следующие техники межличностного общения

- А) ориентировка в собеседнике, активное слушание, обратная связь
- Б) аргументации и контраргументации
- В) кодирование собеседника
- Г) оценка способностей

458. «Этический кодекс медицинской сестры России» принят

- А) Ассоциацией медицинских сестер России
- Б) Международным советом медицинских сестер
- В) Министерством здравоохранения РФ

Г) Всемирной организацией здравоохранения

459. специалист в области сестринского дела проходит аттестацию для получения

- А) квалификационной категории (второй, первой, высшей)
- Б) свидетельства об аккредитации специалиста
- В) диплома об образовании
- Г) повышения квалификации

460. в отношении лиц, завершивших освоение основных образовательных программ СПО по специальности «Сестринское дело», претендующих на осуществление медицинской деятельности, проводится

- А) первичная аккредитация специалистов
- Б) первичная специализированная аккредитация специалистов
- В) периодическая аккредитация специалистов
- Г) аттестация

461. процедура определения готовности лица, получившего высшее или среднее медицинское образование, к осуществлению медицинской деятельности по определённой специальности в соответствии с профессиональным стандартом называется

- А) аккредитация специалиста
- Б) сертификация
- В) лицензирование
- Г) аттестация специалиста

462. формы дополнительного постдипломного профессионального образования по специальности «Сестринское дело»

- А) повышение квалификации, профессиональная переподготовка
- Б) ординатура, аспирантура,
- В) докторантура
- Г) высшее образование (бакалавриат)

463. для получения диплома по другой специальности СПО медицинская сестра должна пройти

- А) профессиональную переподготовку
- Б) дополнительное образование
- В) повышение квалификации
- Г) усовершенствование

464. наименования должностей, которые может занимать медицинская сестра с базовым уровнем СПО по специальности «сестринское дело», включая

- А) медсестра участковая, патронажная, приемного отделения, палатная (постовая), перевязочной, процедурной, стерилизационной

- Б) медицинская сестра - анестезист, операционная медицинская сестра, диетическая
- В) медицинская сестра по косметологии, физиотерапии, реабилитации
- Г) главная медицинская сестра

465. основным принципом философии сестринского дела является уважение к

- А) жизни, достоинствам и правам человека
- Б) правительству
- В) различным организациям
- Г) политике государства

466. философия сестринского дела – это система взглядов на взаимоотношения между

- А) сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой
- Б) обществом и окружающей средой
- В) сестрой и пациентом
- Г) врачом и медицинской сестрой

467. при заболеваниях, состояниях пациента, не сопровождающихся угрозой жизни, если отсрочка не повлечет ухудшения состояния, форма оказания медицинской помощи

- А) плановая
- Б) в экстренной форме
- В) в неотложной форме
- Г) первая помощь

468. при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента оказывают медицинскую помощь

- А) в неотложной форме
- Б) в экстренной форме
- В) плановую
- Г) первую помощь

469. при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента оказывают медицинскую помощь

- А) в экстренной форме
- Б) в неотложной форме
- В) плановую
- Г) первую помощь

470. санаторно-курортное лечение включает медицинские мероприятия профилактические, лечебные и реабилитационные на основе

- А) природных лечебных ресурсов
- Б) лекарственной терапии
- В) иглоукалывания
- Г) гомеопатии

471. медицинская услуга – это комплекс, выполняемых медицинским работником

- А) медицинских вмешательств
- Б) профилактических мероприятий
- В) медицинских обследований и (или) манипуляций
- Г) социальных льгот

472. охрана здоровья является задачей

- А) граждан, государства, общества и медицинских работников
- Б) только государства
- В) всего общества
- Г) пациента и медицинских работников

473. право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется

- А) Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- Б) Трудовым Кодексом РФ
- В) Гражданским кодексом РФ
- Г) Программой развития здравоохранения

474. что обозначает понятие «кумуляция»

- А) накопление
- Б) привыкание
- В) зависимость
- Г) повышенная чувствительность

475. при транспортировке пациента в кресле-каталке представляет опасность расположения рук

- А) за пределами подлокотников
- Б) на животе
- В) в скрещенном состоянии на груди
- Г) на подлокотниках

476. привлекая пациента и его семью к обучению приемам ухода, медицинская сестра должна

- А) определить, что должны знать и уметь пациент и его семья
- Б) получить разрешение у врача
- В) предупредить старшую медицинскую сестру
- Г) получить разрешение у старшей медсестры

477. эмболия при ранении крупных вен

- А) воздушная
- Б) газовая
- В) жировая
- Г) тканевая

478. отек, угрожающий жизни

- А) отек Квинке
- Б) гидроцеле
- В) гидронефроз
- Г) асцит

479. фактор риска неинфекционных заболеваний

- А) гиперхолестеринемия
- Б) дизурия
- В) анемия
- Г) дорсопатия

480. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство подписывается

- А) гражданином (законным представителем) и медицинским работником
- Б) гражданином (законным представителем) и главным врачом
- В) гражданином, законным представителем и руководителем медицинской организации
- Г) гражданином, медицинским работником и представителем страховой медицинской организации

481. документ приемного отделения, который заполняется независимо от того, госпитализирован пациент или нет

- А) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- Б) медицинская карта стационарного больного
- В) статистическая карта выбывшего из стационара
- Г) журнал учета инфекционных больных

482. врачебную тайну обязаны соблюдать

- А) все лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну стали известны при исполнении профессиональных или служебных обязанностей, обучении
- Б) только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и свидетельство об аккредитации специалиста
- В) только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и среднее медицинское образование
- Г) только должностные лица медицинской организации, имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

483. первичная профилактика табакокурения направлена на

- А) некурящих людей
- Б) людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива
- В) курящих людей для оказания помощи в отказе от курения
- Г) людей, которые недавно начали курить

484. продолжительность ежедневной физической нагрузки для профилактики гиподинамии - не менее

- А) 30 минут
- Б) 15 минут
- В) 20 минут
- Г) 60 минут

485. восстановление или компенсация нарушенных функций и трудоспособности человека

- А) реабилитация
- Б) лечение
- В) диагностика
- Г) профилактика

486. наиболее эффективный способ защиты от внешнего гамма-излучения радиоактивных выпадений

- А) укрытие в защитных сооружениях
- Б) своевременная эвакуация
- В) медикаментозная профилактика лучевых поражений
- Г) использование защитной одежды

487. эвакуация пораженных своим транспортом на этапы медицинской эвакуации вышестоящего звена - это эвакуация

- А) «от себя»
- Б) «по назначению»
- В) «по направлению»
- Г) «на себя»

488. способ организации медицинской эвакуации, при котором вышестоящее звено медицинской службы высылает санитарный транспорт к подчиненным этапам эвакуации, называется

- А) «на себя»
- Б) «от себя»
- В) «по назначению»
- Г) «по направлению»

489. этап медицинской эвакуации означает

- А) медицинские организации, развернутые и работающие на путях эвакуации
- Б) все медицинские организации вблизи очага катастрофы

- В) участок пути между медицинскими организациями, в которых оказывается медицинская помощь пострадавшим
- Г) участок от места ранения до ближайшей больницы

490. маршрут, по которому осуществляется вынос (вывоз) и транспортировка пораженных из очага поражения до этапов медицинской эвакуации, называется

- А) путем медицинской эвакуации
- Б) плечом медицинской эвакуации
- В) эвакуационным направлением
- Г) эвакуационным маршрутом

491. виды медицинской сортировки при ЧС

- А) эвакотранспортная и внутripунктовая
- Б) по лечебным показаниям
- В) по эпидемическим показаниям
- Г) эвакуационная

492. в зависимости от степени опасности для окружающих при сортировке пораженных выделяют следующие группы

- А) нуждающиеся в изоляции и нуждающиеся в санитарной обработке
- Б) нуждающихся в неотложной помощи
- В) нуждающихся в эвакуации
- Г) не нуждающиеся в медицинской помощи и эвакуации

493. распределение пораженных на группы, исходя из нуждаемости в первоочередных и однородных мероприятиях (лечебных, профилактических и эвакуационных) в конкретной обстановке называется

- А) медицинской сортировкой
- Б) медицинской эвакуацией
- В) транспортировкой
- Г) оказанием медицинской помощи

494. структура потерь среди населения при катастрофических наводнениях и землетрясениях довольно быстро дополняется

- А) инфекционной заболеваемостью
- Б) сердечно-сосудистыми заболеваниями
- В) поражением легких
- Г) заболеваниями кожи и подкожной клетчатки

495. обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате катастрофы, аварии, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь человеческие жертвы, называется

- А) чрезвычайная ситуация
- Б) чрезвычайное происшествие

- В) чрезвычайное обстоятельство
- Г) чрезвычайное событие

496. при кровотечении местом прижатия сонной артерии является

- А) поперечный отросток 6 шейного позвонка
- Б) поперечный отросток 4 шейного позвонка
- В) угол нижней челюсти
- Г) височная кость

497. непосредственную угрозу жизни в течение нескольких минут представляет

- А) наружное кровотечение
- Б) обморок
- В) закрытый перелом
- Г) вывих

498. у пострадавшего есть шанс выжить, если медицинская помощь будет оказана в течение

- А) первого часа
- Б) двух часов
- В) трех часов
- Г) первых суток

499. обязанности младшей медсестры по уходу за больными

- А) выполнять несложные медицинские манипуляции по уходу, производить смену постельного и нательного белья
- Б) выполнять инъекции
- В) ставить капельницы
- Г) проводить раздачу пищи пациентам

500. функциональные обязанности и должностные инструкции медицинских работников разрабатываются работодателем на основе

- А) профессиональных стандартов
- Б) порядков оказания медицинской помощи
- В) стандартов медицинской помощи
- Г) учебников по сестринскому делу