

3.39. Иерсиниоз (интестинальный иерсиниоз)

Иерсиниозы – группа заболеваний, вызываемых бактериями рода *Yersinia* (способны вызывать заболевание у человека: *Y. pseudotuberculosis* – возбудитель псевдотуберкулеза, *Yersinia enterocolitica* – возбудитель кишечного иерсиниоза и *Y. pestis* – возбудитель чумы).

Иерсиниоз – острая антропоозоонозная кишечная инфекция, сопровождающаяся токсико-аллергической реакцией, отличающаяся мультиочаговостью. Для иерсиниоза характерен фекально-оральный путь передачи. Резервуаром инфекции выступают домашний скот, грызуны и собаки. Инкубационный период иерсиниоза длится не более недели. Клиника складывается из общетоксического синдрома, пятнисто-папулезных высыпаний, диспепсических расстройств; возможны гепатоспленомегалия, артропатический синдром, развитие острого аппендицита, генерализованная форма иерсиниоза. Диагноз устанавливается на основании выделения иерсиний в различных биологических средах больного.

МКБ-10

A04.6 Иерсиниоз

Классификация кишечного (интестинального) иерсиниоза

Этиология	Клинические формы	Клинические варианты	Форма тяжести	Течение
<p><i>Yersinia Enterocolitica</i> O3, O9, O5, O7 и др.</p> <p>1. Бактериологический: посев кала, крови, мочи и др.</p> <p>2. Серологический: - РНГА -ИФА – ELISA: Ab IgM Ab IgG</p> <p>3. Молекулярно-генетический: DNA (PCR)</p>	<p>Гастроинтестинальная</p> <p>Генерализованная</p> <p>Вторично-очаговая</p> <p>Стертая</p> <p>Субклиническая</p>	<p>Гастроэнтерит</p> <p>Терминальный илеит</p> <p>Острый аппендицит (псевдоаппендикулярная)</p> <p>Мезаденит</p> <p>Сепсис</p> <p>Менингит</p> <p>Экзантемы</p> <p>Паренхиматозный гепатит</p> <p>Пневмония</p> <p>Артралгическая (артрит)</p> <p>Нодозная (узловатая) эритема</p> <p>Синдром Рейтера</p> <p>Миокардит</p> <p>Энтероколит</p> <p>Тиреоидит</p>	<p>Легкая форма</p> <p>Среднетяжелая</p> <p>Тяжелая форма</p>	<p>По продолжительности:</p> <p>Острое</p> <p>Затяжное</p> <p>Хроническое</p> <p>По характеру:</p> <p>Гладкое</p> <p>Волнообразное</p> <p>с обострениями и рецидивами</p>

Пример формулировки диагноза:

Иерсиниоз (*Yersinia. Enterocolitica* O3 из кала; РНГА *Yersinia. Enterocolitica* O3 титр 1/200; Ab *Yersinia. Enterocolitica* IgM), гастроинтестинальная форма (гастроэнтерит, терминальный илеит), тяжелая форма, затяжное течение, гладкое.