

3.43. Системный клещевой боррелиоз. Клещевой Лайм-боррелиоз (Хроническая мигрирующая эритема, вызванная *Borrelia burgdorferi*)

Системный клещевой боррелиоз – природно-очаговая вирусная трансмиссивная (передается **иксодовыми** клещами *Ixodes ricinus* - преимущественно в европейском регионе и *Ixodes persulcatus* - преимущественно в азиатском регионе России) инфекция, вызываемая спирохетами рода *Borrelia* (*B. burgdorferi*, *B. garinii*, *B. afzelii*), характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и преимущественным поражением кожи (мигрирующая анулярная эритема), центральной (серозный менингит; лимфоцитарный менинградикулоневрит; мягкотекущий полушарный и стволотый энцефалит; энцефаломиелит;) и периферической (мононевриты – часто N/Facialis) нервной системы, сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит) и опорно-двигательного аппарата (миалгии, артралгии, артриты), склонными к хронизации.

МКБ–10

A69.2. Болезнь Лайма. Хроническая мигрирующая эритема, вызванная *borrelia burgdorferi*

Классификация системного клещевого боррелиоза

Этиология	Формы болезни	Стадия	Период болезни	Степень тяжести	Течение	Доминирующая органная патология
<i>Borrelia burgdorferi</i> <i>Borrelia garinii</i> <i>Borrelia afzelii</i> 1. Бактериологический: посев крови, ликвора. 2. Серологический: -ИФА – ELISA:Ab IgM Ab IgG 3. Молекулярно-генетический: DNA (PCR)	1. Манифестная: - с мигрирующей эритемой - безэритемная 2. Латентная (субклиническая)	I. Локализованная II. Диссеминированная III. Персистирующая: ремиссия обострение	Ранний Поздний Резидуальный	Легкая Средней тяжести Тяжелая	Субклиническое Острое Подострое Хроническое	Поражение кожи Поражение нервной системы Поражение сердечно-сосудистой системы Поражение опорно-двигательного аппарата Поражение печени

Пример формулировки диагноза:

Болезнь Лайма (Ab IgM и Ab IgG *Borrelia burgdorferi*), острая манифестная, среднетяжелая форма, стадия ранней локализованной инфекции. Мигрирующая эритема средней степени тяжести.