

Задача 4.9.1.

Больная К. 13 лет, поступила с жалобами на частые головные боли, кардиалгии, не связанные с физической нагрузкой, беспокойный сон и раздражительность. Данные жалобы появились впервые около года назад после развода родителей. Периодически отмечает подъемы артериального давления до 130/80 мм рт. ст. (критерий артериальной гипертензии для данного возраста, пола и роста 123/72 мм рт.ст.).

От 1 беременности, протекавшей с поздним гестозом, асфиксия в родах, на первом году жизни наблюдалась у невролога, дальнейшее развитие ребенка без особенностей. У матери девочки нейроциркуляторная дистония, у бабушки - гипертоническая болезнь.

Девочка астенического телосложения. Отмечается гипергидроз подмышечных впадин, кистей рук и стоп. Конечности холодные. Тоны сердца звучные, ритмичные, в положении лежа выслушивается короткий негрубый систолический шум на верхушке, исчезающий в положении стоя. Пульс 64 удара в минуту, удовлетворительного наполнения. Периферическая пульсация на нижних конечностях сохранена. По др.внутренним органам без патологии. АД 130/80 мм рт. ст. на обеих руках. Отправления не нарушены.

Анализ крови, все анализы мочи без патологии.

По Эхо-КГ исключена органическая патология сердца.

На глазном дне изменений нет.

УЗИ внутренних органов без патологии.

По данным СМАД – артериальная гипертензия I степени, индекс времени повышенного АД менее 50% днем, ночью АД нормальное.

Выберите правильный вариант диагноза:

1. Артериальная гипертензия I степени.
2. Лабильная артериальная гипертензия, НИЦД, синусовая брадикардия.
3. Лабильная артериальная гипертензия.