

8.5. Хронические расстройства питания

Хроническое расстройство питания – патологическое состояние, характеризующееся нарушениями физического развития, метаболизма, иммунитета, морфофункционального состояния внутренних органов и систем организма в результате недостаточного или избыточного поступления и/или усвоения питательных веществ.

МКБ-10

E 44.0 Умеренная белково-энергетическая недостаточность

E 44.1 Легкая белково-энергетическая недостаточность

E 45 Задержка развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью

E 64.0 Последствия белково-энергетической недостаточности

Классификация Зайцевой Г.А., Строгоновой Л.А.

В зависимости от характера нарушений трофики у детей первых двух лет жизни:

- Дистрофия типа гипотрофия – дефицит массы тела по отношению к росту
- Дистрофия типа паратрофия – избыток массы тела по отношению к росту
- Дистрофия типа гипостатура – равномерное отставание массы тела и роста от возрастных норм.

В зависимости от характера нарушений трофики у детей более старших возрастов:

- Дистрофия типа ожирения
- Дистрофия типа алиментарного маразма (истощение, кахексия у детей дошкольного и школьного возрастов).

По времени возникновения:

- пренатальная (внутриутробная, врожденная)
- постнатальная (приобретенная)
- смешанная форма.

По тяжести течения выделяют:

- I степень (легкая) 10-20%
- II степень (среднетяжелая) 20-30%
- III степень (тяжелая) более 30%.

По этиологии:

- Экзогенная (алиментарная, инфекционная, нарушение режима детей раннего возраста)
- Эндогенная (синдром мальабсорбции, пороки развития ЖКТ и других органов, наследственные нарушения обмена веществ, иммунодефицитные состояния, эндокринные заболевания, выраженные поражения ЦНС)

Период:

- начальный
- прогрессирования
- реконвалесценции

Пример формулировки диагноза:

Гипотрофия II степени, постнатальная, период прогрессирования.